

제품명	풍림무약 (유한메디카) 메모라이트캡슐
포장타입	설명서
규격	138(w) x 175(h) mm / 접지규격 35 x 35 mm
포장사양	
디자인	리드팜 디자인팀 황선화 차장 02-525-2742 (직통) nk_h@naver.com

색상	후가공
먹1도	

최종검토일자 수정사항
250915 규격 수정, 내용 수정 소재지 글자크기 수정, 내용 수정

제품명 30pt (캡슐 9pt), 11pt 일반의약품 7pt, 유효성분 7pt, 내용 7pt, 글간격 1pt 이상

Yn

유한메디카

서울특별시 동작구 노량진로74, 6층

풍림무약주식회사

경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 120

2.8mm
7pt

일반의약품

메모라이트캡슐

인삼40%에탄올건조엑스·은행엽건조엑스

일반의약품

메모라이트캡슐

인삼40%에탄올건조엑스·은행엽건조엑스

【원료약품 및 그 분량 : 이 약 1캡슐 중】

유효성분 : 인삼40%에탄올건조엑스(별규)100mg

은행엽건조엑스(EP)60mg

첨가제(타르색소) : 적색40호, 청색1호, 황색5호

첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소의 우유)

기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 캡슐, 함수이산화규소

【성상】

황갈색의 가루가 들어있는 오렌지색의 경질캡슐제

【효능·효과】

- 집중력 및 주의력 저하, 기억력감퇴

- 다음과 같은 말초 동맥 순환장애 증상의 개선 : 현기증(어지러움)

【용법·용량】

1일 2회(아침, 점심 식사후), 1회 1캡슐을 경구 투여한다(복용한다).

연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약의 복용(사용)하지 말 것

1) 이 약에 과민증 환자

2) 12세 이하의 소아(소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않는다.)

3) 임부(동물시험에서 기형발생은 없었으나 임신중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다.)

4) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

1) 출혈 장애가 있거나 출혈의 위험을 증가시키는 약물(항응고제(예 : 펜프로쿰론, 와파린)), 항혈소판제(예 : 클로피도그렐, 아세틸살리실산 및 기타 비스테로이드성 항염증제))를 복용하고 있는 환자

2) 수유부(모유로 이행여부가 알려지지 않음)

3) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기

병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것.

4) 이 약은 적색40호(알루라레드 AC, Allura Red AC)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중단하고 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것, 상담시 가능한 첨부문서를 소지할 것

1) 수술이 예정된 자

2) 복용 3개월 후 증상의 개선이 없거나 악화되는 경우

3) 이상반응

① 드물게 가벼운 위장관(창자) 불편감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.

② 은행엽엑스(경구, 단일제) 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989-2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다.

다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

• 어지러움

• 가려움증

③ 기타 : 아나필락시스 또는 아나필락시스 반응 보고가 있다. 다만, 이로써 해당성분과 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

4. 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항

이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 직사광선을 피하여 건조하고 서늘한 곳에 보관한다.

【포장단위】 100캡슐/병

【저장방법】 밀폐용기, 상온(15~25℃)보관

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품을 사용하지 마십시오.

※ 사용(유효)기한이 경과되었거나, 유통과정 중 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입하셨을 때는 구입한 곳을 통하여 즉시 교환하여 드립니다.

※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 통해 확인하실 수 있습니다.

※ 의약품 부작용 발생 시 한국약품안전관리원(1644-6223) 또는 의약품 피해구제 전용번호(14-3330)를 통해 부작용 피해구제를 신청하실 수 있습니다.

개정연월일 : 2025년 09월 15일

제 조 자

풍림무약주식회사

경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 120

판 매 자

유한메디카

서울특별시 동작구 노량진로 74, 6층