



일반의약품

건조한 눈, 피로한 눈에 눈 영양제

코드비타

연질
캡슐

눈의
영양공급

코드리버오일
(대구간유)

효능인증
의약품

콘드로이친
함유

광동

1일 2회 2캡슐 2개월분

120캡슐 X 2

건조한 눈, 피로한 눈에 눈 영양제

코드비타

연질
캡슐

[제조자] 동방에프티엘㈜
경기도 화성시 향남읍 제막공단 4길 78

[판매처] 광동생활건강㈜
서울특별시 서초구 서초대로50길 94, 5층

DONGBANG FTL

동방에프티엘(주)

제조번호 : CDV 403

사용기한 : 2027. 02. 23

까지



18806805008819



콘드로이친

콘드로이친

코드리버오일

코드리버오일

코드리버오일

연질
캡슐

비타민A

비타민A

일반의약품

이 내용은 소비자의 안전한 선택을 위해 허가사항을 요약한 것으로 복용전 반드시 포장의 기재사항을 확인하십시오

[유효성분]

· 간유(EP)(비타민A로서 500IU) : 500mg
· 콘드로이틴설페이트나트륨(KP) : 25mg
· 티아민질산염(KP) : 6.3mg
· 리보플라빈(KP) : 3mg

[효능·효과]

○ 다음 경우의 비타민 A, B1, B2의 보급
· 육체피로 : 임신·수유기 : 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시 : 노년기
· 이 약에 함유된 티아민 등의 효능 : 효과는 다음과 같다.
· 눈의 건조감의 완화 : 야맹증(밤에 잘 못 보는 증상)
· 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
· 각기 : 눈의피로

[용법·용량]

만 8세 이상 및 성인 : 1일 2회, 1회 2캡슐 복용

[사용상의 주의사항]

1. 경고
(1) 임부에 비타민A(레티놀)를 1일 5,000IU이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민A를 5,000IU/일 이상 투여하지 말 것(비타민 A결핍증 환자는 제외)
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
(1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
(2) 만 3개월 미만의 젖먹이
(3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
(4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
3. 다음과 같은 사람(경우)은 이약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것
(1) 만 1세 미만의 젖먹이
(2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
(3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
① 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민A를 10,000IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 증상으로 하는 기형발현(기형발생) 증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있

는 여성에는 비타민A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민A 투여는 5,000IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다.
(4) 고지단백혈중, 당뇨병성고지혈혈중 및 체장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
(5) 이 약은 적색40호를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 포장의 기재사항을 소지할 것.
(1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통풍성 관절부종(부기), 붉은 변, 설사, 변비, 식욕부진, 흥분(붉은 반점), 두드러기, 습진, 발진, 반구진상 발진, 가려움, 부종(부기), 부종(부기)-수분차류(고임)(신부전 또는 심부전 환자)
(2) 장기간 고용량의 비타민A(베타카로틴으로부터 전환된 것을 제외한) 섭취는 폐경기를 지난 여성의 골다공증(백형성증) 위험을 높일 수 있다.
(3) 우발적으로 과량복용 한 경우
(4) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
(1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
(2) 어린이에게 투여할 경우에는 보조자의 지도·감독하에 투여할 것.
(3) 이 약에 함유된 비타민A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000IU이상을 넘지 않도록 한다.
(4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
(5) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 존재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.
6. 저장상의 주의사항
(1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
(2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
(3) 오형(알못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

[사용기한] 측면 표기일까지

[첨가제] : 첨가제(타르색소) : 적색3호, 적색40호, 청색1호 · 첨가제(동물유래성분) : 백납(벌꿀, 말린), 젤라틴(소, 가축) · 기타 첨가제 : D-소르비톨, 농글리세린, 레시틴, 산화티탄, 정제수, 글리콜, 아자경화유

[성상] 주황색의 내용물을 함유한 알칼리의 타원형 연질캡슐

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상 받을 수 있습니다.
(구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질·변패·오손된 제품을 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)
※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nefrug.mfds.go.kr>)의 의약품 정보를 참조하십시오.
※ 의약품 부작용 신고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

건조한 눈, 피로한 눈에 눈 영양제

코드비타

연질
캡슐

건조한 눈

피로한 눈

야맹증

침침한 눈

백백한 눈