

일반의약품 정보

이 약을 사용(복용)전 반드시 포장의 기재사항을 확인하세요

【유효성분】 1정(945mg) 중

디오스민(KP) 600mg

【효능·효과】

1. 정맥부전과 관련된 증상의 개선 : 다리 중압감, 통증 2. 모세혈관 취약증에 의한 장애의 보조치료 3. 치질과 관련된 징후의 치료

【용법·용량】

· 치질 : 디오스민으로서 1회 600mg 1일 2 ~ 3회 (1,200~1,800mg) 식사 시 복용한다. · 정맥 부전 : 디오스민으로서 1회 600mg 1일 1회 식사 시 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것 1) 이 약 성분에 과민증이 있는 환자 2) 수유부 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것 1) 임부(필요한 경우에만 이 약 투여가 고려되어야 한다.) 2) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 이 약 투여 후 소화장애가 나타날 수 있으나, 치료를 ➡

【사용상의 주의사항】(계속됨)

중단하는 경우는 드물다.

4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항 1) 이 약을 투약해도 다른 항문 질환에 대한 특별한 치료법이 면제되지 않는다. 2) 이 약은 오랜 기간 투약하지 말아야 한다. 3) 증상이 빨리 나아지지 않으면, 항문검사를 실시해야 하며 치료를 재검토해야 한다.

5. 일반적 주의 1) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다. 2) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온보관(1-30°C)

【사용기한】 측면의 표시일까지

【포장단위】 10정/피티피(10정/PTP×1), 60정/상자(10정/PTP×6)

【첨가제】

·기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산, 콜로이드성이산화규소, 탭실드분홍색(11P1178), 탭실드클리어(92C569), 탈크

【성상】 분홍 또는 연분홍의 원형 필름코팅정제