

총 근 당

콘드로이틴
설페이트나트륨
800mg을 함유한
고함량 신장비타민

메코발라민 1,000 μg
칼슘, 마그네슘 | 비타민 D

총근당

조인트 콘드로정



일반의약품

제품정보 QR코드



이 약을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시오, 약과 함께 보관하십시오.

[유요성분] [정 중]

콘드로이틴설페이트나트륨(KP).....800mg

시트르산칼슘수화물(별규).....100mg

(칼슘으로서 21.08mg)

벤포티아민(KP).....50mg

(티아민염산염으로서 36.16mg)

파리독신염산염(KP).....50mg

니코틴산아미드(KP).....30mg

판토텐산칼슘(KP).....15mg

뉴클레오타이드(EP).....10mg

(비타민D로서 1000 I.U)

리보플라빈(KP).....6mg

메코발라민(KP).....1mg

신화마그네슘(KP).....30mg

(마그네슘으로서 18.09mg)

동물유래성분 : 콘드로이틴설페이트나트륨 (소, 연골), 유당수화

물, 소, 우유)

기타첨가제: 정결정구산, 미결정셀룰로스, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 탭솔드 갈색 919749, 히드록시프로필셀룰로스, 히프소멜로스

[성질]

갈색의 타원형 필름코팅정

[효능·효과]

○ 다음 종류의 비타민 D, B1, B2, B6의 보충

- 육체피로
- 임신 - 수유기
- 병중 - 병후병을 앓는 동안이나 회복 후의 체력저하시
- 발육기
- 노년기

-이 약에 함유된 비타민 등의 효능 - 효과는 다음과 같습니다.

- 뼈, 이의 발육발달
- 구루병의 예방
- 각기
- 눈의 피로
- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(오토, 어깨결림 등), 구강염(입교염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 실염(혀염), 습진, 피부염

[용법·용량]

만 19세 이상 성인 : 1일 1회, 1회 1정 복용

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 3) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 4) 신장결석 환자
- 5) 심한 증상의 신부전 환자
- 6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose maldabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에서는 투여하면 안 됩니다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제(미네랄 함유제)
- 2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자

- 1) 알부민 및 인산칼슘을 기능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.
- 3) 심장, 순환기계기능 장애 환자
- 4) 신장장애 환자
- 5) 저단백혈증 환자
- 6) 강직성관절염 투여 중인 환자
- 가 신장결석 병력이 있는 환자
- 8) 임부

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - 구역, 구토, 설사, 물은 반, 식욕부진, 복부팽만감, 변비, 저혈압, 열골감, 심박동불규칙, 피부발진, 붉은 반점, 부종, 신장축색(심장박동정지, 중추신경계 기능저하, 흉만, 두드러기, 소진, 발진, 반전수정 발진, 가려움, 부종, 부종 - 수부자극(신부전 또는 심부전 환자)
- 2) 파리독신을 1일 500 mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 각각 신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 3) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
- 4) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내분포도장애(성상선(glucosetolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고고산혈증(hyperursemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
- 5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 유행성

- 부진, 부종(부) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 6) 정기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있습니다.
- 가 할랄도스데르제, 트라킬데르제 병용 투여 시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 8) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법 - 용량을 잘 지켜십시오.
- 2) 오를 황색으로 변하게 하여 임상징후(예) 영향을 줄 수 있습니다.
- 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전후에는 피하십시오.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 작사광선을 피하고 빛을 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.
- 3) 오염(접촉 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(~30℃)보관

[포장단위] 60정/상자(30정/병 x 2), 120정/상자(60정/병 x 2)

[소비자상담실] 080-6776-080(수신자 부담)

귀인이 사용기간이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품은 사용하지 마시고 구입하신 곳에서 교환하십시오.

약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관해야 합니다.

KGPM(우의약품 제조 및 품질관리기준) 적격소재제품 101

【제조의회사】



충청남도 천안시 서북구 성거읍 당항로 797-48
구인치론의 및 소비자상담실 : 080-6776-080(수신자 부담)
제품상세정보 : www.ckdpharm.com 참조

【제조사】

주 노바엠헬스케어

경상북도 경산시 하양읍 지식산업4로 16-53

* 제품 사용 후 이상반응(부작용)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원(1044-6222)에 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

이 첨부문서 작성일자(2023.08.10)이후 변경된 내용은 총근당 인터넷 홈페이지(www.ckdpharm.com)나 소비자 상담전화(080-6776-080)를 통해 확인할 수 있습니다.

