

2XB

MQ

근육경련·혈액순환개선 복합비타민제
산화마그네슘 414.53mg
활성비타민B12 메코발라민 500ug 고함량 함유

투엑스비엠큐^정

[원료약품 및 그 분량] 1정(1195밀리그램) 중

■ 유효성분 :

산화마그네슘(KP)(마그네슘(으)로서 250mg).....	414.53mg
메코발라민 (KP).....	0.50mg
유비데카레논 (KP).....	5.00mg
토코페롤아세테이트 2배산(KP)(비타민E(으)로서 125 I.U.).....	250.00mg
감마-오리자놀 (KP).....	5.00mg

■ 기타첨가제 : 경질무수구산, 미결정셀룰로오스(102), 스테아르산마그네슘, 크로스포비돈, 탭실드갈색(29B1093), 히드록시프로필셀룰로오스

[성 상] 갈색의 타원형 필름코팅정

[효능·효과]

1. 다음경우의 비타민 E의 보급·노년기 2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다. - 말초혈행장애 및 경년기시 다음 증상의 완화: 어깨-목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움) 3. 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

[용법·용량]

만 12세 이상 및 성인 : 1일 2회, 1회 1정을 복용(사용)한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것.

1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 2) 만 12개월 미만의 젖먹이 3) 심한 증상의 신부전 환자

2. 이 약을 복용(사용)하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것.

1) 인산염, 갈슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 3) 심장·순환기계기능 장애 환자 4) 신장장애 환자 5) 저단백혈증 환자 6) 임부

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 - 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐)
- 붉은 반점, 설사, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다. 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용(사용)하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용(사용)할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있다. 4) 골산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다. 5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 유헤심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. 6) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용(사용))투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것. 7) 우발적으로 과량복용(사용) 한 경우 8) 1개월 정도 복용(사용)하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용(사용) 시 주의사항

1) 경해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용(사용)중, 복용(사용)전후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 60정/병, 120 정/상자 (60 정/병 × 2), 10정/피티피

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[설명서작성년월일] 2023.06.02

구입시 사용기간이 경과하였거나 변질 또는 소손된 제품은 약국, 병원, 의원, 도매상 개설자에 한하여 교환하여 드리오니 이와 같은 제품은 구입 유통 경로를 통해서 반송하여 주시기 바랍니다. 소비자 문의는 본사 마케팅부 (수신자부담:080-549-0002)에서 상담해 드리며, 제조과정과 관련된 제품의 품질에 대한 문의사항은 백암공장 품질경영본부 (전화:080-332-0002)로 연락바랍니다. 제품 사용 후 부작용 (이상반응)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원 (1644-6223) 혹은 의약품 피해구제 전용 상담번호 (14-3330)에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다. *설명서작성년월일 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지 (www.jeilhs.co.kr) 또는 식물의약품안전처 의약품통합정보시스템 (http://nedrug.mfds.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.*

[제조의뢰원]



제일 헬스사이언스 경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 7 B동

[제조원]

메딕스제약(주) 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 170