

8가지 복합 소화성분으로 빠르고 속편하게! 속편하겐정

일반 의약품

복용하시기 전에 설명서를 주의깊게 읽어보시고, 반드시 제품과 함께 보관하십시오.

【제품명】속편하겐정

■ **원료약품 및 그 분량** 1정(494.665mg) 중

■ 유효성분 :

침강탄산칼슘(KP).....	100mg
탄산수소나트륨(KP).....	50mg
트리메부틸말레산염(KP).....	50mg
메타규산알루미늄산화물(KP).....	40mg
((건조물이며) 산화알루미늄으로서 12.92mg, 산화마그네슘으로서 5.08mg)	
감초가루(생구).....	25mg
(글리시리진산으로서 0.63mg)	
디아스타제 · 프로테아제 · 셀룰라제 2000IU(별규).....	20mg
(전분당화력(pH 4.5) 278 단위, 단백소화력(pH 3.0) 170 단위)	
리파제(KP).....	7.5mg
(지방소화력(pH 6.0) 45 단위)	
스코폴리나엑스(KP).....	5mg
(총알칼로이드(하오스시미인 및 스코폴라민)로서 50μg)	
■ 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소의 유유)	
■ 첨가제(타르산소) : 청색1호, 황색203호	
■ 기타첨가제 : 박하유, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 저자화히드록시프로필셀룰로오스, 폴리에스테르산화규소, 크로스카멜로오스나트륨, 포비돈, 폴리에틸렌글리콜6000, 히프록셀로스	

【성상】녹색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 식체(위체), 구역, 구토, 위통, 신트림, 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

【용법·용량】성인 1회 2정, 1일 3회 매 식간 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 투석요법을 받고 있는 환자
- 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 이 약으로 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움증)을 일으킨 일이 있는 환자
- 2) 다른 약물을 투여받고 있는 환자
- 3) 신장에 환자
- 4) 간장에 환자
- 5) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 6) 인산염 저하가 있는 환자

3. 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 월경이 높은 환자 또는 고령자
- 2) 심장 또는 신장에 장애가 있는 환자
- 3) 부종(부기)이 있는 환자
- 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 본체의 복용에 의해 노양이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사와 상담할 것
- 2) 위일도스테론증 : 1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기연용(계속복용)할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고인), 부종(부기), 체중증가 등의 위일도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관촬혈청 칼륨치의 측정해 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지할 것.

3) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타나는 경우가 있으므로, 관촬을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지할 것.

5. 복용 중 또는 복용 후는 다음 사항을 주의할 것.

칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크리산) 또는 차이지제 이뇨제(트리클로로메타지아이드)와 병용(함께 복용)시 위일도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여할 것.

6. 부작용

- 1) 이 약을 투여함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움 등)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
- 2) 이 약을 투여함으로써 드물게 동계, 졸음, 현훈(어지러움), 권태감, 두통이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
- 3) 이 약을 투여하는 동안 드물게 변비, 또는 입이 마르는 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
- 4) 순환기계 : 드물게 심계항진(두근거림)이 나타날 수 있다.
- 5) 간장 : 드물게 GOT, GPT 상승이 나타날 수 있다.

7. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법, 용량을 잘 지켜다.
- 2) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
- 3) 장기연용(계속 복용)을 하지 않는다.
- 4) 신장병의 병력이 있는 환자는 복용전에 의사 또는 약사와 상의한다.

8. 상호작용

위장전통, 진경제와 병용 투여(함께 복용)하지 않는다.

9. 소아·임부에 대한 투여

- 1) 이 약은 소아(15세 미만)에게는 투여하지 않는다.
- 2) 임신부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유중인 부인에게는 투여하지 않는다.

10. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한곳에 밀전하여 보관한다.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【저장방법】차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】10정

【제조회지】경남제약(주) 충청남도 아산시 신항면 서부남로790번길 49

【제조자】주식회사 노비알헬스케어 경상북도 경산시 하양읍 자작산업4로 16-53

※ 기타주의

1. 허가된 효능·효과와 다른 용도로 사용 시에는 예상하지 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.
2. 사용기한이 지난 제품은 변질의 우려가 있으므로 사용을 금하시기 바랍니다.
- ※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사 및 자사 소비자 상담실로 문의하시기 바랍니다. 소비자 상담전화: 080-232-8600, www.kyungnampharm.com
- ※ 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질·변태 또는 오염된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회고시 "소비자분쟁해결기준"에 의거하여 구입한 곳에서 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.
- ※ 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템 「<https://nedrug.mfds.go.kr>」 → 의약품 등 검색을 참조하시기 바랍니다.
- ※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)