

조인트콤비800 정



고함량 콘드로이친과 메코발라민을 한번에!

[유효성분] 1정 중

콘드로이틴설페이트나트륨(KP)(동물유래성분: 소, 연골)	800mg
벤포티아민(티아민염산염)으로서 36.15mg(KP)	50mg
니코틴아미드(KP)	50mg
피리독신염산염(KP)	50mg
판토텐산칼슘(KP)	15mg
리보플라빈(KP)	6mg
메코발라민(KP)	1000μg
농축콜레칼시페롤 산(비타민D3로서 1000I.U)(EP)	10mg
이노시톨(KP)	25mg
콜린타르타르산염(별규)	25mg

■ 동물유래성분: 콘드로이틴설페이트나트륨(기원:소, 사용부위:연골)

[첨가제]

경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 크로스포비돈, 탭실드갈색(99B703)

[성상]

적갈색의 장방형 필름코팅정

[효능·효과]

○ 다음 경우의 비타민 D, B₁, B₂, B₆의 보급 - 육체피로 - 임신·수유기 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시 - 발육기 - 노년기 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다. 뼈, 이의 발육불량·구루병의 예방·각기·눈의 피로·다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

[용법·용량] 만 19세 이상 성인: 1회 1정, 1일 1회 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis: 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 3) 신장결석 환자 2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. 1) 레보도파 3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 - 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다. 3) 신장결석 병력이 있는 환자 4. 다음과 같은

경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 - 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 변비, 식욕부진, 흥분, 두드러기, 습진, 발진, 반구진성 발진, 가려움, 부종, 부종·수분저류(신부전 또는 심부전 환자) 2) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. 3) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다. 4) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다. 5) 우발적으로 과량복용한 경우 6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우 5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다. 6. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[포장단위] 30 정/병, 60 정/상자(30정 / 병 X 2)

[소비자상담실] 02-570-3971, 3981 (반쯤 및 교환처: 구입처)

[제조자의뢰자] 일양바이오팜(주) 충북 제천시 바이오밸리3로 8, 홈페이지주소: www.ilyangbio.co.kr

[제조자] 성미바이오(주) 강원특별자치도 원주시 지정면 지래울로 184 1층 일부, 3층

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다. ※ 본 제품은 공정거래위원회고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다. ※ 의약품 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오. ※ 설명서 작성일자(2023.09.01)이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다. ※ 부작용 보고 및 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

작성연월일: 2023.09.01
관리번호: PI2309-00