

t/z: 단일 소설 반감기
* 비교평가항목치를 로그변환한 평균치 차의 90% 신뢰구간

15. 기타

- 이 약 사용 시 각 단일제의 허가사항을 참고한다.
16. 보관 및 취급상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지 면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

【저장방법】

기밀용기, 실온 (1~30 °C) 보관

【포장단위】

30정/병, 100정/병

제조판매자 제일약품(주)

본사 : 서울특별시 서초구 사령대로 343

공장 : 경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 7 (B동 외)

구입시 사용기간이 경과하거나 변형 또는 오손된 제품은 약국, 병원, 의원, 도매상 개설자에 한하여 교환하여 드리오니 이와 같은 제품은 구입 유통 경로를 통해서 반송하여 주시기 바랍니다. 소비자 문의는 본사 마케팅부(수신자부호: 080-555-7171)에서 상담해 드리며, 제조과정과 관련된 제품의 품질에 대한 문의사항은 백암공장 품질경영본부(전화: 080-333-6312)로 연락바랍니다. 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원(1644-6223) 혹은 의약품 피해구제 전용 상담번호(14-3330)에 문의하여 부작용 피해구제신청을 할 수 있습니다.

설명서작성년월일: 2023. 08. 17
ML-B-0000-Y8-01

【첨부 · 용량】

이 약은 몬테루카스트의 투여가 필요한 천식환자로서 알레르기 비염을 동반한 환자에 투여한다. 성인 및 만5세 이상의 청소년 : 1회 1회, 1회 1정을 저녁에 경구투여한다.

몬테루카스트와 레보세티리진을 병용으로 복용하고 있는 환자인 경우, 복용의 편리함을 위하여 이 약 (개개의 주성분 함량이 동일한 복합제)으로 전환할 수 있다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

- 1) 신경정신계 이상사례
몬테루카스트를 투여한 환자에서 중대한 신경정신계 이상사례가 시판 후 조사에서 보고되었다. 보고된 사례는 매우 다양하며, 초조, 공격적 행동, 불안, 우울, 지나친 장애, 주의력장애, 말더듬증, 수면장애 및 환각, 불면, 기억장애, 강박증, 청신운동과다활동 (과민성, 불안정, 전진 표현), 풍물병, 자살 충동 및 행동 (자살 포함), 턱 등이 포함된다. 몬테루카스트와 연관된 신경정신계 이상사례에 관한 기준은 현재 잘 알려져 있지 않다.

- 이 약을 처방 시, 의사는 이 약의 유익성 및 위해성에 대하여 환자 및 보호자와 논의하고, 이 약을 복용 시 새로운 신경정신계 증상 또는 행동의 변화에 대해 주의를 기울이도록 환자 및 보호자에게 설명한다. 행동의 변화가 관찰되거나 새로운 신경정신계 증상 또는 자살 생각 또는 자살 행동이 발생하는 경우 이 약의 복용을 중단하고 의사에게 즉시 알리도록 하여야 한다. 대부분이 이 약의 복용을 중단 후 증상이 개선되었으나, 일부에서 이 약의 복용을 중단한 후에도 증상이 지속되었다. 증상이 개선될 때까지 저속적으로 모니터링하고 대중요법을 제공하여야 한다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 이 약의 구성성분 및 허드록시진 또는 피페라진유도체에 과민반응 환자

- 2) 신부전 환자 (CLCR < 10mL/min), 혈액투석을 받고 있는 환자

- 3) 일부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부

- 4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성 (galactose intolerance), Lapp 유당분 해효소 결핍증 (Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 신장에 환자 (레보세티리진의 높은 혈중 농도가 지속될 수 있다.)

- 2) 간장에 환자 (레보세티리진의 높은 혈중 농도가 지속될 수 있다.)

- 3) 고령자 (레보세티리진의 높은 혈중 농도가 지속될 수 있다.)

4. 이상반응

- 1) 15세 이상의 청소년 및 성인 다년성 알레르기 비염 증상이 있는 천식환자

- 이 약에 대한 안전성은 15세 이상의 청소년 및 성인으로 다년성 알레르기 비염 증상이 있는 천식환자 224명을 대상으로 한 몬테루카스트 일상시험에서 평가되었다. 4주간의 치료기간 동안 이 약 투여군에서 환하게 보고된 이상반응은 상기도감염 (3.51%), 비인두염 (2.63%), 위장관에 (1.75%), 편도염 (1.75%) 이었다. 이 약과 관련된 이상약물반응은 구강 1건, 심전도 QT연장 1건 이었으며, 모두 경증으로 나타났다. 다음 표는 이 일상시험에서 인과관계와 상관없이 전체 투여군 224명 (몬테루카스트 투여군 110명, 이 약 투여군 114명)에서 발생한 이상반응 중 1% 이상 보고되거나, 몬테루카스트 투여군보다 높은 비율로 발생한 이상반응도를 요약한 것이다.

신체기관별 이상반응	몬테루카스트 투여군(n=110) N(%)	이 약 투여군(n=114) N(%)	전체 투여군 N(%)
------------	------------------------------	---------------------------	-------------------

5. 위장관 질환

- 소화불량 0(0%) 1(0.88%) 1(0.45%)

- 위염 0(0%) 1(0.88%) 1(0.45%)

- 위장장애 0(0%) 2(1.75%) 2(0.89%)

- 위-식도 역류 질환 0(0%) 1(0.88%) 1(0.45%)

- 과민성 대장 증후군 0(0%) 1(0.88%) 1(0.45%)

- 대장통증 0(0%) 1(0.88%) 1(0.45%)

6. 일반적 장애와 투여부위 상태

- 안면부종 0(0%) 1(0.88%) 1(0.45%)

- 통증 0(0%) 1(0.88%) 1(0.45%)

- 구강 0(0%) 1(0.88%) 1(0.45%)

7. 감염

- 비인두염 0(0%) 3(2.63%) 3(1.34%)

- 인두염 0(0%) 1(0.88%) 1(0.45%)

- 부비강염 0(0%) 1(0.88%) 1(0.45%)

- 편도염 1(0.91%) 2(1.75%) 3(1.34%)

- 상기도감염 4(3.64%) 4(3.51%) 8(3.57%)

8. 검사

- 심장도 QT 연장 0(0%) 1(0.88%) 1(0.45%)

- 대사 및 영양장애

- 코글레스테롤증 0(0%) 1(0.88%) 1(0.45%)

9. 성형

- 알츠하이머 치매 0(0%) 1(0.88%) 1(0.45%)

- 열공성 낙경색 0(0%) 1(0.88%) 1(0.45%)

10. 신경 질환

- 불면증 0(0%) 1(0.88%) 1(0.45%)

11. 호흡기 질환

- 호흡곤란 0(0%) 1(0.88%) 1(0.45%)

12. 15세 이상의 청소년 및 성인 다년성 알레르기 비염 증상이 있는 천식환자

- 이 약에 대한 안전성은 15세 이상의 청소년 및 성인으로 다년성 알레르기 비염 증상이 있는 천식환자 224명을 대상으로 한 몬테루카스트 및 레보세티리진 병용투여군과 개개 성분 단독투여군을 비교하는 일상시험에서 평가되었다. 4주간의 치료기간 동안 병용투여군에서 환하게 보고된 이상반응은 상기도감염 (2.20%), 두통 (2.20%), 월경곤란 (2.20%), 비건조 (2.20%), 두드러기 (2.20%), 심실성기회수증 (1.10%), 안면경련 (1.10%), 구강염 (1.10%), 천식 (1.10%), 구강염 (1.10%), 편도염 (1.10%), ALT 상승 (1.10%), AST 상승 (1.10%), 천식 (1.10%), 구강염 두통증 (1.10%), 피부병증 (1.10%) 이었다. 이 약과 관련된 이상약물반응은 구강건조 1건, ALT (Alanine aminotransferase) 상승 1건, AST (Aspartate aminotransferase) 상승 1건, 비건조 1건, 편도염 1건, ALT 상승 (1.10%), AST 상승 (1.10%), 천식 (1.10%), 구강염 두통증 (1.10%), 피부병증 (1.10%) 이었다. 다음 표는 이 일상시험에서 인과관계와 상관없이 전체 투여군 283명 (몬테루카스트 투여군 98명, 레보세티리진 투여군 91명)에서 발생한 이상반응 중 1% 이상 보고되거나, 개개 성분 단독투여군보다 높은 비율로 발생한 이상반응도를 요약한 것이다.

신체기관별 이상반응	몬테루카스트 투여군(n=98) N(%)	이 약 투여군(n=91) N(%)	전체 투여군 N(%)
------------	-----------------------------	--------------------------	-------------------

13. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지 면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

【저장방법】

기밀용기, 실온 (1~30 °C) 보관

【포장단위】

30정/병, 100정/병

제조판매자 제일약품(주)

본사 : 서울특별시 서초구 사령대로 343

공장 : 경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 7 (B동 외)

【저장방법】

기밀용기, 실온 (1~30 °C) 보관

【포장단위】

30정/병, 100정/병

제조판매자 제일약품(주)

본사 : 서울특별시 서초구 사령대로 343

공장 : 경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 7 (B동 외)

【저장방법】

기밀용기, 실온 (1~30 °C) 보관

【포장단위】

30정/병, 100정/병

제조판매자 제일약품(주)

본사 : 서울특별시 서초구 사령대로 343

공장 : 경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 7 (B동 외)

【저장방법】

기밀용기, 실온 (1~30 °C) 보관

【포장단위】

30정/병, 100정/병

제조판매자 제일약품(주)

본사 : 서울특별시 서초구 사령대로 343

공장 : 경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 7 (B동 외)

【저장방법】

기밀용기, 실온 (1~30 °C) 보관

【포장단위】

30정/병, 100정/병

제조판매자 제일약품(주)

본사 : 서울특별시 서초구 사령대로 343

공장 : 경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 7 (B동 외)

【저장방법】

기밀용기, 실온 (1~30 °C) 보관

【포장단위】

30정/병, 100정/병

제조판매자 제일약품(주)

본사 : 서울특별시 서초구 사령대로 343

공장 : 경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 7 (B동 외)