


최대 함량 콘드로이친 800mg 함유

비타콘틴 800정

VITA CHONTIN

활성비타민 B₁₂ 메코발라민 1,000 μ g
벤포티아민 50mg 함유



관절통 / 신경통 / 근육통 / 어깨결림 / 요통 / 육체피로 / 눈의 피로

원료약품 및 분량

이 약 1정 중

- 유효성분:
 - 콘드로이틴설페이트나트륨(KP) ----- 800mg
 - 벤포티아민(KP) ----- 50mg(티아민염산염으로서 36.15mg)
 - 니코틴아미드(KP) ----- 50mg
 - 피리독신염산염(KP) ----- 50mg
 - 판토텐산칼슘(KP) ----- 15mg
 - 리보플라빈(KP) ----- 6mg
 - 메코발라민(KP) ----- 1000 μ g
 - 니코틴아미드설페이트 산(EP) ----- 10mg(비타민D3(오)로서 1000 IU)
 - 이소시톨(KP) ----- 25mg
 - 클린티라리드산염(별규) ----- 25mg
- 동등유래성분: 콘드로이틴설페이트나트륨(소, 연골)
- 기타 첨가제: 경질무수규산, 마결정셀룰로오스, 스테아르산나트륨, 전분글리콜산나트륨, 크로스보인드, 덱스트라제(99B703)

성상

작갈색의 정방형 필름코팅정

효능·효과

- 오더를 경우의 비타민 D, B₁, B₂, B₆의 보급
- 육체피로
- 임신수유기
- 병중병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
- 발육기
- 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 뼈, 이의 발육불량
 - 구루병의 예방
 - 각기
 - 눈의 피로
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

【용법·용량】 만 19세 이상 성인: 1회 1정, 1일 1회 복용한다.

사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 고칼혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 만 12개월 미만의 유아
 - 신장결석 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
 - 레노도파
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
-비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼혈증을 일으킬 수 있다
 - 신장·순환기계기능 장애 환자
 - 신장장애 환자
 - 저단백혈증 환자
 - 신장결석 병력이 있는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상당 시 가능한 한 이 참부문을 소지할 것.
 - 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
- 구역, 구도, 설사, 묽은 변, 변비, 식욕부진, 흥분, 두드러기, 습진, 발진, 반구진성 발진, 가려움, 부종, 부종수분저류(신부전 또는 심부전 환자)
 - 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병증 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
 - 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 μ g 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
 - 고당량 투여에 의해 소화성 위장을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간소산을 일으킬 수 있다.
 - 대량투여로 인해 구역, 구도 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
 - 항알로스테로제, 테라스테렌과 병용투여시 고칼혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것
 - 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에서 영향을 줄 수 있다.
 - 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

저장상의 주의사항

- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
- 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【포장단위】 60 정/상자(30정/병 X 2)

【저장방법】 실온보관(1~30℃), 밀폐용기

【사용기한】 외부 포장에 표시된 사용기한 내 사용

【제조회지】 코오롱제약(주) 대전광역시 대덕구 문정서로18번길 45

【제조자】 성미바이오제약 주식회사 강원특별자치도 원주시 지정면 지래로로 184 1층 일부, 3층

-최종개정연월일 : 2024.03.06