



위와 장이 편한 복합 위장관치료제

더판디탈 정

【성분·함량】 1정 중

■ 유효성분 : 침강탄산칼슘(KP)	100mg
탄산수소나트륨(KP)	50mg
트리메부틴말레산염(KP)	50mg
메타규산알루미늄산마그네슘(KP)	40mg
((건조물이며)산화알루미늄으로서 12.92mg, 산화마그네슘으로서 5.08mg)	
감초가루(생규)	25mg
(글리시리진산으로서 0.63mg)	
디아스타제 · 프로테아제 · 셀룰라제 2000-IV(결규)	20mg
(전분당화력(pH 4.5) 278 단위, 단백소화력(pH 3.0) 170 단위)	
리파제(KP)	7.5mg
(지방소화력(pH 6.0) 45 단위)	
스코폴리아엑스(KP)	5mg
(총알칼로이드 [히요스시아민 및 스코폴라민]로서 50 µg)	

■ 첨가제(타르색소) : 청색1호, 황색203호

■ 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소·우유)

■ 기타첨가제 : 박하향, 스티라크산마그네슘, 산화티탄, 옥수수전분, 자치환도하드록시프로필셀룰로오스, 크로스카멜로오스나트륨, 클로이드성아산화규소, 폴리에틸렌글리콜6000, 포마덴, 히드로멜로오스

【성상】 녹색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】 위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 식제(위제), 구역, 구토, 위통, 신트림, 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

【용법·용량】 성인 1회 2정, 1일 3회 매 식간 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 투석요법을 받고 있는 환자
- 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당) 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하지 마십시오.

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 이 약으로 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움증)을 일으킨 일이 있는 환자
- 2) 다른 약물을 투여받고 있는 환자
- 3) 신장에 환자
- 4) 간장애 환자
- 5) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 6) 안산염 저하가 있는 환자

3. 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 알칼피가 높은 환자 또는 고령자
- 2) 심장 또는 신장에 장애가 있는 환자
- 3) 부종(부기)이 있는 환자
- 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 본제의 복용에 의해 노양이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담하십시오.
- 2) 위알도스테론증 : 1일 최대 복용량이 감소로서 1g이상인 제제는 장기연용(계속복용)할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증에 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지하십시오.

3) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지하십시오.

5. 복용 중 또는 복용 후에는 다음 사항을 주의하십시오.

- 1) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크리산) 또는 치아지드계 이뇨제(트리클로르메타치아이드)와 병용(함께 복용)시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여하십시오.
6. 부작용
 - 1) 이 약을 투여함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움 등)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
 - 2) 이 약을 투여함으로써 드물게 동맥, 졸음, 현훈(어지러움), 권태감, 두통이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
 - 3) 이 약을 투여하는 동안 드물게 변비, 또는 입이 마르는 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
 - 4) 순환기계 : 드물게 심계항진(두근거림)이 나타날 수 있습니다.
 - 5) 간장 : 드물게 GOT, GPT 상승이 나타날 수 있습니다.

7. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법, 용량을 잘 지켜ပါ.
- 2) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
- 3) 장기연용(계속 복용)을 하지 않습니다.
- 4) 신장병의 병력이 있는 환자는 복용전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.

8. 상호작용

위장진통, 진경제와 병용 투여(함께 복용)하지 않습니다.

9. 소아·임부에 대한 투여

- 1) 이 약은 소아(15세 미만)에게는 투여하지 않습니다.
- 2) 임신부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유중인 부인에게는 투여하지 않습니다.

10. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀봉하여 보관합니다.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

【저장방법】 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 10정/상자(10정/PTP)

※ 구입 시 사용기한이 경과되었거나 유통과정 중 변질, 변태 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회 고시 '소비자 분쟁 해결 기준'에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 본 작성(제정)년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 및 홈페이지 또는 식물의약품안전처 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>)를 통하여 확인할 수 있습니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223 또는 14-3330)

【제품문의】 (02)2211-6700, www.sinilpharm.com

제조의뢰자 : **신일제약(주)**

본사 : 서울특별시 동대문구 시가정로 272
공정 : 충청북도 충주시 양성면 북상골길 28

제조사 : **(주)노바엠헬스케어**

경상북도 경산시 하양읍 지식산업4로 16-53

