

센비큐^정

피로회복을 위한
고함량기능성활성비타민

【원료약품 및 그 분량】 1정(1,311mg) 중

유효성분

벤포티아민(KP)(티아민염산염(으)로서 97.61mg)	135.0mg
리보플라빈(KP)	100.0mg
니코틴아미드(KP)	10.0mg
판토텐산칼슘(KP)	100.0mg
피리독신염산염(KP)	100.0mg
폴산(KP)	0.1mg
메코발라민(KP)	0.5mg
이노시톨(KP)	30.0mg
콜린타르타르산염(별규)	30.0mg
우르소데옥시콜산(KP)	50.0mg
DL-메티오닌(KP)	10.0mg
베타인염산염(USP)	20.0mg
셀레늄함유건조효모(KP)(셀레늄(으)로서 60μg)	111.1mg
L-시스테인(JP)	25.0mg
타우린(KP)	100.0mg
산화마그네슘(KP)(마그네슘(으)로서 18.1mg)	30.0mg
산화아연(KP)(아연(으)로서 16.1mg)	20.0mg
농축클레칼시페롤 산(EP)(비타민D(으)로서 1,000 IU)	10.0mg

첨가제

■ 기타 첨가제: 경질무수구산, 히드록시프로필셀룰로오스, 미결정셀룰로오스, 크로스포비돈, 스테아르산마그네슘, 탭실드노란색(52Y241)

【성상】 노란색의 타원형 필름코팅정

【효능·효과】

1. 다음 경우의 비타민 D, B₁, B₂, B₆의 보급

육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시, 발육기, 노년기

2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과를 다음과 같다.

- 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
- 각기, 눈의 피로, 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방

3. 아연의 보급

【용법·용량】 만 19세 이상 및 성인: 1일 1회, 1회 1정 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis: 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장(콩팥)질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 3) 만 12개월 미만의 영아
- 4) 신장(콩팥)결석 환자
- 5) 심한 증상의 신부전 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - ① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다
- 3) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
- 4) 심장-순환기계기능 장애 환자
- 5) 신장(콩팥)장애 환자
- 6) 저단백혈증 환자
- 7) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자

8) 임부

9) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증, 위장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성유체를 신중히 투여해야 하는 환자 및 임부, 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 고령자(노인)

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의 하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우

구역, 구토, 설사, 묽은 변, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 피부염, 땀·호흡기악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종, 복부불쾌감, 변비, 식욕부진, 발진

2) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.

3) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.

4) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.

5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 우혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.

6) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용)투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.

7) 우발적으로 과량복용 한 경우

8) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상감사지에 영향을 줄 수 있습니다.
- 3) 녹차, 홍차 등 탄산을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관합니다.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 60 정/병, 120 정/상자(60정/병×2)

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품일 경우에는 구입처에서 교환해드립니다.

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어아 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

※ 의약품은 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하시고, 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

※ 작성일자 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

소비자상담실 수신자부담전화: 080-708-8070

boryungconsumer.co.kr

BORYUNG 보령컨슈머헬스케어  메디스제약  진양제약

【판매처】 보령컨슈머헬스케어(주) 서울특별시 종로구 창경궁로 136(원남동, 보령빌딩)

【제조자】 메디스제약(주) 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 170

【제조회자】 진양제약(주) 강원특별자치도 원주시 지정동 신평로 34