

철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료

헤모이지정

Hemoeasy Tab.

[원료약품 및 그 분량] 1정(524.1밀리그램) 중

- 유효성분 : 폴리말토오스수산화제이철착염(철로서35mg)(KP).....125.0mg, 판토텐산칼슘(KP).....100mg, 폴산(KP).....0.5mg
- 첨가제(동물유래성분) : 루디프레스(소,우유)
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산, 스테아릴푸마르산나트륨, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 적색산화철, 콜로이드성이산화규소, 폴리에틸렌글리콜6000, 히프로멜로오스

[성 상] 적갈색의 장방형 필름코팅정제

[효능·효과] 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료

[용법·용량] 만 8세 이상의 어린이 및 성인 : 1일 1회 1정 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 경고

(1) 철 함유제제는 만 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- (1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- (2) 만 12개월 미만의 영아
- (3) 혈액색소(철대사 이상으로 철이 간장, 췌장(이자)에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증, 비철결핍성 빈혈
- (4) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성 (galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소결핍증 (Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactosemalabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

(1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

(1) 만 1세 미만의 영아 (2) 의사의 치료를 받고 있는 환자 (3) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자 (4) 심장 · 순환기계기능 장애 환자 (5) 신장장애 환자 (6) 저단백혈증 환자

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

(1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 두드러기, 가려움, 광선과민반응, 복부 · 위통증, 경련, 구토, 설사, 열, 혼수 (2) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. (3) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것. (4) 우발적으로 과량복용 한 경우 (5) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

(1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것. (2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 투여할 것. (3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

7. 저장상의 주의사항

(1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것. (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

[사용기한] 제조일로부터 36개월

[포장단위] 30정/상자(10정/PTP x 3)

구입시 사용기간이 경과하였거나 변질 또는 오손된 제품은 약국, 병원, 의원, 도매상 개설자에 한하여 교환하여 드리오니 이와 같은 제품은 구입 유통 경로를 통해서 반송하여 주시기 바랍니다.

소비자 문의는 본사 마케팅부(수신자부담:080-549-0002)에서 상담해 드리며, 제조과정과 관련된 제품의 품질에 대한 문의사항은 백암공장 품질경영본부(전화: 080-332-0002)로 연락바랍니다.

제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원(1644-6223) 혹은 의약품 피해구제 전용 상담번호(14-3330)에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

"설명서작성년월일 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(www.jeilhs.co.kr) 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다."

제조의뢰 및 판매원

제일헬스사이언스(주) 경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 7 B동

제조원

(주)마더스제약 전라북도 익산시 삼기면 산단오릉길 38 마더스제약 제2공장