

일반의약품 **조제용**

변비에 따른 증상의 완화

마민에스정

1,000정

[원료약품 및 그 분량] 1정(775 밀리그램) 중

■ 유효성분 : 수산화마그네슘(KP) 500mg
티아민질산염(KP) 1.5mg

■ 기타첨가제 : 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 크로스카
멜로오스나트륨, 크로스포비돈, 탭솔드흰색(29W925)

[성상] 흰색의 타원형 필름코팅정

[효능·효과]

변비, 변비에 따른 다음 증상의 완화 : 식욕부진(식욕감퇴), 복부 팽만, 장내이상
발효, 치질

[용법·용량]

○ 성인(만 15세 이상) : 1회 1정 1일 3회 식전(식간(식사 때와 식사 때 사이) 또는
식후)에 복용한다.

○ 만 11세 이상 ~ 만 15세 미만 : 1회 1정 1일 2회 아침, 저녁 공복시(식전 또는
식간에) 복용한다. 복용간격은 4시간 이상으로 한다. 다만, 초회(처음 복용)는
최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량(양을 늘림) 또는
감량(줄임)한다.

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 급성 복부질환(충수염, 장출혈, 궤양성 결장염 등) 환자
 - 장폐색(창자막힘) 환자
 - 만 7세 이하의 어린이
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 심한 복통(배 아픔) 또는 구역, 구토 환자
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
 - 신장(콩팥)장애 환자
 - 다른 약물을 복용하고 있는 사람
 - 직장의 출혈 혹은 장부전의 병력이 있는 사람
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와
상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 이 약을 복용함으로써 발진·충혈되어 붉어짐, 가려움, 심한 복통(배 아픔),
설사, 구토 등이 나타날 경우
 - 1주 정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것
 - 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여)
보관할 것
 - 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지
말 것

[포장단위] 1000정 / 병

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1 ~ 30 °C) 보관

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[소비자상담실] 080-811-3011

[판매자 및 제조자] 메딕스제약(주) / 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 170

- 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었
거나 변질·변패·오염되거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 의약품판매업자에
한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 "소비자 분쟁해결기준"에
의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다.
- 최종 개정연월일(2023.10.25) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처의약품통합
정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인 할 수 있습니다.
- 제품의 사용기한은 외부 포장에 표기되어 있습니다.
- 부작용보고 및 피해구제신청 : 한국의약품안전관리원(14-3330 혹은 1644-6223)

Medix 메딕스제약

제조번호 : 00000

사용기한 : 0000. 00. 00



231025-01