

기억력 감퇴
집중력 저하
주의력 저하
현기증

유럽에서 개발된 생약복합성분

메모레인 캡슐

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐(425mg) 중,

- 유효성분 : 은행엽건조엑스(EP) 60.00mg
인삼40%에탄올건조엑스(별규) 100.00mg
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 캡슐, 콜로이드성이산화규소, D-만니톨

[성상] 황갈색의 가루가 든 흰색의 경질캡슐제

[효능·효과]

- 집중력 및 주의력 저하, 기억력 감퇴
- 다음과 같은 말초 동맥 순환장애 증상의 개선 : 현기증

[용법·용량] 1일 2회(아침, 점심 식사 후), 1회 1캡슐을 경구 투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 12세 이하의 소아(소아의 사용 경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않는다.)
- 3) 임부(동물시험에서 기형발생은 없었으나 임신중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다.)

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 출혈 장애가 있거나 출혈의 위험을 증가시키는 약물(항응고제(예:펜프로쿰, 와파린)), 항혈소판제(예:클로피도그렐, 아세틸살리실산 및 기타 비스테로이드성 항염증제))를 복용하고 있는 환자
- 2) 수유부(무유로 이행여부가 알려지지 않음)

3. 다음과 같은 경우 이 약을 복용(사용)을 즉각 중단하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것, 상담 시 가능한 첨부문서를 소지할 것

- 1) 수술이 예정된 자
- 2) 복용 3개월 후 증상의 개선이 없거나 악화되는 경우
- 3) 이상반응
 - ① 드물게 가벼운 위장관 불쾌감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.
 - ② 은행엽엑스(경구, 단일제) 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989-2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로써 곧 해당 성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
·어지러움 ·가려움증
 - ③ 기타 : 아나필락시스 또는 아나필락시스 반응 보고가 있다. 다만, 이로써 해당 성분과 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

4. 기타 이 약의 복용(사용) 시 주의할 사항 이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하여 건조하고 서늘한 곳에 보관한다.

[저장방법] 밀폐용기, 15 ~ 25℃ 보관

[포장단위] 60캡슐/상자 (10캡슐/PTP X 6)

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품이며 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다.
만약, 구입 시 사용(유효) 기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.
- ※ 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 부작용 피해 구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223)
- ※ 가장 최근 개정된 제품설명서의 내용 등 본 제품에 대한 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>) 또는 당사 홈페이지(<http://dkpharm.co.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.
- ※ 제품에 관한 의문사항은 동국제약(주) 소비자상담실 ☎080-550-7575: 수신자 요금 부담)로 문의 주십시오.

• 제조자: 동국제약(주) 충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 33-19

설명서 최종 개정 연월일 : 2023.10.23