

청인 하이뷰

코드리버오일 함유 눈 영양제

연질
캡슐

일반의약품



건조한 눈 피로한 눈 z^2 아맹증

광동

120 캡슐 × 2EA

청인 하이뷰

연질
캡슐

- 건조한 눈 · 충혈된 눈
- 피로한 눈 · 아맹증

DONGBANG FTL 동방에프티엘(주)

[제조자] 동방에프티엘(주)
경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 78

[판매원] 광동생활건강(주)
서울특별시 서초구 서초대로50길 94, 5층

제번호: CHV 303

사용기한: 2026. 12. 15



대한민국 식품의약품안전처

하이뷰 코드리버오일

유통기한
· 2026. 12. 15
· 2026. 12. 15



일반의약품

120 캡슐 × 2EA

청인 하이뷰

연질
캡슐

- 건조한 눈
- 피로한 눈
- 충혈된 눈
- 아맹증

일반의약품

이 내용은 소비자의 안전한 선택을 위해 허가사항을 요약한 것으로 복용할 반드시 포장의 기재사항을 확인하십시오

[유효성분]	
· 간유(EP)(비타민A로서 500IU) ······	500mg
· 콘드로이틴설페이트나트륨(KP) ······	25mg
· 토코페롤아세테이트(KP)(비타민E로서 25IU) ······	25mg
· 티아민질산염(KP) ······	10mg
· 리보플라빈(KP) ······	5mg

[효능·효과]	
○ 다음 경우의 비타민 A, E, B1, B2의 보급	
- 육체피로 - 임신·수유기 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하	- 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.	
· 눈의 건조감의 완화 · 아맹증(밤에 잘 못 보는 증상)	
· 말초혈행장애 및 경년기시 다발 증상의 완화: 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)	
· 다발 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입안염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염	
각기 · 눈의피로	

[용법·용량]	
만 8세 이상 및 성인: 1일 2회, 1회 2캡슐 복용	

[사용상의 주의사항]	
1. 경고	
(1) 임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 말 것(비타민 A 결핍증 환자는 제외).	
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것	
(1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자	
(2) 만 3개월 미만의 젖먹이	
(3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자	
(4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자	

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.
(1) 만 1세 미만의 젖먹이
(2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
(3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
① 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생) 증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는

경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만에서 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다.
(4) 고지단백혈증, 당뇨병성고지혈증 및 체장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
(5) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF) 및 황색203호(퀴놀린옐로우 WS, Quinoline Yellow WS)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 포장의 기재사항을 소지할 것.
(1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종(부기), 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 붉은 변, 식욕부진, 흥분(붉은 반점), 두드러기, 습진, 반구전성 발진, 부종(부기), 수분저류(고임)/(신부전 또는 심부전 환자)

(2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
(3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.

(4) 장기간 고용량의 비타민 A(베타카로틴으로부터 전환된 것)를 제외한 섭취는 폐경기를 지난 여성의 골다공증(뼈약성증) 위험을 높일 수 있다.

(5) 우발적으로 과량복용 한 경우
(6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
(1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
(2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것.
(3) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 한다.
(4) 요를 활색으로 변화시켜 하여 임상감사지에 영향을 줄 수 있다.
(5) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈청지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조정한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 존재하고 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항
(1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
(2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
(3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법]	기밀용기, 실온(1~30°C) 보관
[사용기한]	표면 기밀일까지

[첨가제] · 첨가제(타르색소): 황색5호, 황색203호, 청색1호 · 첨가제(동물유래성분): 백납(백분, 밀납), 젤라틴(소, 가축) · 기타 첨가제: D-소르비톨, 폴리비닐피롤리돈, 레시틴, 산화티탄, 정제수, 공기, 아자경화유

[성상] 주황색의 내용물을 함유한 암녹색의 타원형 연질캡슐

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상 받을 수 있습니다.
(구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질·변패·오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)
※ 약품용 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nefrug.mfds.go.kr>)의 의약품 정보를 참조하십시오.
※ 부작용 보고: 한국의약품안전관리원(1644-6223)