

관절 건강을 위한 선택!

조인엑트 800^정

일반의약품

【원료약품 및 그 분량】 1정(1,330밀리그램) 중

■ 유효성분 :	
콘드로이틴설페이트나트륨(KP)	800mg
벤조티아민(KP) (티아민염산염으로서 36.15mg)	50mg
니코틴산아미드(KP)	50mg
파리독신염산염(KP)	50mg
판토텐산칼슘(KP)	15mg
리보플라빈(KP)	6mg
콜레칼시페롤농축분말(EF) (비타민D로서 1,000 아이.유)	10mg
메코발라민(KP)	1,000μg
산화마그네슘(KP) (마그네슘으로서 15.1mg)	30mg
시트르산칼슘수화물(USP) (칼슘으로서 6.32mg)	30mg

- 첨가제(동등유래성분) : 유당수화물(소, 우유), 콘드로이틴설페이트나트륨(소, 연골)
- 기타첨가제 : 경질무수구산, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 탭탈도라네(52Y241)

【성상】 담황색의 타원형 필름코팅정

【효능·효과】

1. 다음 경우의 비타민 B₁, B₂, B₆, D의 보급
 - 육체피로 - 임신, 수유기 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하시 - 발육기 - 노년기
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 뼈, 이의 발육발달
 - 구루병의 예방 - 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요통(허리), 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염 - 각기 - 눈의 피로

【용법·용량】 만 19세 이상 성인 : 1일 1회, 1회 1정 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장(콩팥)질환 환자
 - 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 3) 만 12개월 미만의 젖먹이
 - 4) 신장(콩팥)결석 환자
 - 5) 심한 증상의 신부전 환자
 - 6) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 7) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
 - 8) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
 - 2) 레보도파
3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - ① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
 - 3) 심장·순환 기계기능 장애 환자
 - 4) 신장(콩팥) 장애 환자
 - 5) 저단백혈증 환자
 - 6) 감시배당체를 투여 중인 환자

- 7) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자
- 8) 임부
- 9) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 변비, 저혈압, 얼굴 달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 식욕부진, 흥분, 습진, 발진, 반구진성 발진, 가려움, 부종(부기), 부종(부기)·수분지류(신부전 또는 심부전 환자)
- 2) 파리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 3) 콜산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- 4) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- 5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 6) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
- 7) 항알도스테론제, 트리암테네과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- 8) 우발적으로 과량 복용 한 경우
- 9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상 검사치에 영향을 줄 수 있다.
- 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전, 후에는 피할 것.

6. 일반적 주의

- 1) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다.
- 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약종의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관

【사용기한】 케이스 하단 표시일까지(연, 월, 일)

【포장단위】 120정/상자(60정/병×2)

【소비자상담실】 080-811-3011

- 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 의약품판매업자에 한하여 교환하여 드리고, 공정거래위원회에서 고시한 “소비자 분쟁해결기준”에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상에 드립니다.
- 의약품용 사용기한 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어와 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 첨부문서 최종 개정연월일(2024.03.19) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인 할 수 있습니다.
- 제품의 사용기한은 외부 포장에 표기되어 있습니다.
- 부작용보고 및 피해구제신청 : 한국약물안전관리원(14-3330 혹은 1644-6223)

【판매자】  **광동** 서울특별시 서초구 서초대로 50길 94, 5층

【제조자】  **메디스제약** MEDIX PHARM. CO., LTD. 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단6로 170

첨부문서 작성 연월일 : 2024.03.19(Rev.01)

 **MEDIX PHARM. CO., LTD.**