

※ 이 약을 사용(복용)전 반드시 첨부문서를 확인하십시오.

N2311



스마트한 활성형 메가비타민

일반의약품

분류번호:319

맥스케어^정

【유효성분 및 그 분량】 1정 중

■유효성분 : 벤토티아민(KP) (티아민염산염(으)로서 36.16mg)	50mg
리보플라빈(KP)	50mg
니코틴산아미드(KP)	50mg
판토텐산칼슘(KP)	50mg
피리독신염산염(KP)	50mg
비오틴(USP)	0.25mg
폴산(USP)	0.2mg
시아노코발라민(KP)	0.05mg
콜린타르타르산염(별규)	50mg
이노시톨(KP)	50mg
아스코르브산 과립97%(별규) (아스코르브산(으)로서 50mg)	51.55mg
토코페롤아세테이트 2배산(KP) (비타민E(으)로서 10 I.U)	20mg
셀레늄화유건조효모(KP) (셀레늄(으)로서 25μg)	16.67mg
산화아연(KP) (아연(으)로서 15mg)	18.67mg
우르소데옥시콜산(KP)	15mg

■첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소·우유)

■기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 이산화규소, 크로스카멜로오스나트륨, 톱실드 갈색 91B749, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스

【성 상】 갈색의 타원형 필름코팅형

【효능·효과】

○ 다음 경우의 비타민 E, B₁, B₂, B₆, C의 보급

- 육체피로
- 임신·수유기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하
- 노년기

○ 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
- 각기, 눈의 피로

○ 아연의 보급

【용법·용량】 만 12세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 1~2정 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태)
- 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
- 5) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 6) 신장장애 환자
- 7) 저단백혈증 환자
- 8) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토, 묽은 변, 피부염, 땀·호흡시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
- 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
- 5) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 6) 폴산이 부족한 환자(예로 비타민 B12를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다).
- 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
- 8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 9) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 10) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 11) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오.
- 2) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
- 3) 요를 황색으로 변화시켜 하여 임상감사치에 영향을 줄 수 있습니다.
- 4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관

【포장단위】 120 정/상자(60정/병*2)

【사용기간】 제조일로부터 36 개월

【취급상의 주의사항】

- ※ 구입 시 사용기한이 경과되었거나 유통과정 중 변질, 변태 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회고시 "소비자 분쟁해결기준"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.
- ※ 본 설명서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 또는 식품의약품안전처 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr/>)를 통하여 확인할 수 있습니다.
- ※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)
- ※ 제품문의 : (02)2211-6700, www.sinilpharm.com

■ 제조/외주, 판매자 : 신일제약(주)

본사 : 서울특별시 동대문구 사가정로 272
공장 : 충청북도 충주시 양성면 복상길 28

■ 제조자 : 노보바엘헬스케어

경상북도 경산시 하양읍 자식산4로 16-53



설명서 개정년월일 : 2023.11.21