

덴치원 캡슐

(청위산)

【성분·함량】 1캡슐 중

승마 (KP)	1,250mg
목단피 (KP)	940mg
당귀 (KP)	630mg
황련 (KP)	630mg
생지황 (생규)	630mg
이상 건조엑스로서	375.36mg

첨가제(타르색소) : 적색3호, 청색1호, 황색4호

첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소-우유)

기타 첨가제 : 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 전분글리콜산니트룸, 콜로이드성아산화규소, 캡슐

【효능·효과】 위열(胃熱)에 의한 치통

【성상】 갈색의 분말이 충전된 상부 열은 회색색, 하부 흰색의 경질캡슐제

【용법·용량】 보통 성인 1회 2캡슐을 1일 3회 식전 또는 식간에(식사때와 식사때 사이에)복용하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 염증성 열이 있는 환자
- 2) 몸에 열이 있는 환자
- 3) 몸이 허약하여 마른 기침을 하는 환자
- 4) 비위가 허약하고 장이나 위에 적체가 있는 환자
- 5) 신생아, 수유부, 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(이 약에 함유되어 있는 황련, 목단피에 의해 유-조산(조기분만)의 위험이 있습니다.)
- 6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해 효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락 토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의하십시오.

- 1) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임) 하는 등 주의하십시오.)
- 2) 다른 약물을 투여 받고 있는 환자
- 3) 현저하게 위장이 허약한 환자(식욕부진, 위부(상복부)불쾌감, 구역, 구토, 설사 등이 나타날 수 있습니다.)
- 4) 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있습니다.)
- 5) 이전에 간질환 병력이 있거나 다른 심각한 건강상 위험이 있었던 환자
- 6) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우

- (1) 소화기계 : 식욕부진, 위부(상복부)불쾌감, 구역, 구토, 설사 등
- (2) 간질환으로 의심되는 증상(피곤, 식욕부진, 황달, 구역 및 구토를 동반하는 심각한 상부 위의 통증, 진한 뇨 등)
- 2) 수일간 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 다른 한약(생약)제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의하십시오.
- 3) 1주 이상 계속하여 복용하지 마십시오.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.(사용 후 반드시 밀폐 보관하십시오.)
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 20캡슐/상자(10캡슐/PTPX2)

※ 구입 시 사용기한 또는 유효기간이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
 ※ 본 설명서 작성(개정)년월일일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 또는 식품의약품안전처 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>)를 통하여 확인하실 수 있습니다.
 ※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223 또는 14-3330)
 ※ 제품문의: (02)2211-6700, www.sinilpharm.com

제조의뢰자: 신일제약(주)

본사: 서울특별시 동대문구 사가정로 272

공장: 충청북도 충주시 양성면 복상골길 28

제조사: 경방신약(주)

제 1공장: 인천광역시 남동구 남동대로 394

제 2공장: 충청남도 금산군 부리면 인삼약초공단로 27



설명서 개정년월일 : 2023.12.01