

알리코

비오틴정 5mg (비오틴)

[성분·함량] 1정 중

- 유효성분: 비오틴(USP) ~ 5mg
- 첨가제(동물유래성분): 유당 수화물(기원: 소, 사육부위: 우유)
- 기타 첨가제: 경질수규산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 포비돈

[성상] 흰색의 원형 정제

[효능·효과] 비오틴 결핍으로 인한 손발톱 또는 모발 성장 장애

[용법·용량] 1일 1회 1정, 식사 전 복용

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 3개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)
- 3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자

2. 이 약을 복용(사용)하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.

- 1) 날계란 흰자와 비오틴이 비가역적이며 약효가 없는 복합체를 형성하므로 날계란과 비오틴을 동시에 복용하지 않는다.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 임부, 수유부: 임신부·수유부가 복용한 경우에 대한 임상 연구는 제시되어 있지 않다. 또한 임신, 태아의 발달 단계, 태반의 발달 및 출생 후 과정에 미치는 영향에 관한 동물 연구도 충분히 이루어지지 않았다. 지금까지 임신부 복용에 있어서의 부정적인 영향에 대하여 알려진 바는 없지만 임신 중의 복용은 신중하게 이루어져야 한다. 또한 작용물질은 모유로 분비된다.
- 2) 항경련제 복용환자: 카르바마제핀, 페니토인, 페노바르비탈이 비오틴의 대사를 증가하여, 오랫동안 지속되는 항경련제 투여로 비오틴의 혈중농도 감소가 발생된다.
- 3) 항생제 복용환자: 항생제의 사용은 대장에 있는 박테리아에 의해 생성되는 비오틴을 감소시킬 수 있다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 두드러기, 위장장애
- 2) 식사일량을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아, 단단히 마개로 막아) 보관한다.
- 3) 오남용을 피하고 품질을 보호유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

[저장방법 및 사용기간] 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관, 제조일로부터 36개월

[포장단위] 30정, 90정

[제조사] 태극제약(주) / 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 123

[학술정보문의] 080-585-0004

※ 본 의약품은 우수약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용(유효) 기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 복용(사용)하지 마십시오.

※ 이 약을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.

※ 개정일자 이후 변경된 내용은 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)를 참조하십시오.

※ 의약품 부작용 신고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

작성(개정)연월일: 2023. 12. 04
01/202312

[제조외리자]



충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 21