



소화효소가 포함된 8종 복합소화제

위엔프레쉬정



[원료약품 및 그 분량] 1정 중

■ 유효성분 : 침강탄산칼슘(KP)	100mg
탄산수소나트륨(KP)	50mg
트리에부틴말레산염(KP)	50mg
메타규산알루민산마그네슘(KP)((건조물이며)산화알루미늄으로서 12.92 mg, 산화마그네슘으로서 5.08 mg)	40mg
감초가루(생규)(글리시리진산으로서 0.63 mg)	25mg
디아스타제 · 프로테아제 · 셀룰라제2000IV(별규)(전분당화력(pH 4.5) 278 단위, 단백소화력(pH 3.0) 170 단위)	20mg
리파제(KP)(지방소화력(pH 6.0) 45 단위)	7.5mg
스코폴리아엑스(KP)(총알칼로이드[히오스시아민 및 스코폴라민]로서 50 µg)	5mg

- 첨가제(타르색소) : 청색1호, 황색203호
- 첨가제(동물유래) : 유당수화물 (기원동물 : 소, 사육부위 : 우유)
- 기타 첨가제 : 박하유, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 콜로이드성이산화규소, 크로스카멜로오스나트륨, 포비돈, 폴리에틸렌글리콜6000, 히프로멜로오스

[성상] 녹색의 원형 필름코팅정(앞 : TG 뒤 : WN)

[효능 · 효과] 위산과다, 속쓰림, 위부(상복부)불쾌감, 위부(상복부)팽만감, 식체(제함)(위체), 구역, 구토, 위통, 신트림, 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 소화장애, 소화불량으로 인한 위부(상복부)팽만감

[용법 · 용량] 성인 1회 2정, 1일 3회 매 식간(식사때와 식사때 사이) 복용

[사용상의 주의사항]

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 투석요법을 받고 있는 환자
 - 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 이 약으로 알레르기 증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움증)을 일으킨 일이 있는 환자
 - 2) 다른 약물을 투여받고 있는 환자
 - 3) 신장장애(신장(콩팥)장애) 환자
 - 4) 간장애 환자
 - 5) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 6) 인산염 저하가 있는 환자
- 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 혈압이 높은 환자 또는 고령자(노인)
 - 2) 심장 또는 신장(콩팥)에 장애가 있는 환자
 - 3) 부종(부기)이 있는 환자
 - 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 본제의(이 약의) 복용에 의해 노량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담할 것.
 - 2) 위알도스테론증 : 1일 최대 복용량이 감소로서 1g 이상인 제제는 장기연용(계속 복용)할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지할 것.
 - 3) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지(팔다리)경련, 마비 등의

이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지할 것.
5. 복용 중 또는 복용 후는 다음 사항을 주의할 것.
칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 치아지드계 이뇨제(트리클로르 메치아지드)와 병용(함께 복용)시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여할 것.

6. 부작용
 - 1) 이 약을 투여함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움 등)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
 - 2) 이 약을 투여함으로써 드물게 동계(두근거림), 졸음, 현훈(어지러움), 권태감, 두통이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
 - 3) 이 약을 투여하는 동안 드물게 변비, 또는 입이 마르는 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
 - 4) 순환기계 : 드물게 심계항진(두근거림)이 나타날 수 있다.
 - 5) 간장 : 드물게 GOT, GPT 상승이 나타날 수 있다.

7. 일반적 주의
 - 1) 정해진 용법, 용량을 잘 지킨다.
 - 2) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
 - 3) 장기연용(계속 복용)을 하지 않는다.
 - 4) 신장(콩팥)병의 병력이 있는 환자는 복용전에 의사 또는 약사와 상의한다.

8. 상호작용
위장진통, 진경(경련 완화)제와 병용 투여(함께 복용)하지 않는다.

9. 소아·임부에 대한 투여
 - 1) 이 약은 소아(15세 미만)에게는 투여하지 않는다.
 - 2) 임신부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유중인 부인에게는 투여하지 않는다.

10. 저장상의 주의사항
 - 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 직사일광(햇빛)을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 10정/상자(10정/피티피), 100정/상자(10정/피티피×10), 200정/상자(10정/피티피×20)

[사용(유효)기간] 제조일로부터 36개월

※ 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질 · 변패 · 오염되거나손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
※ 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 복용(사용)하지 마십시오.
※ 이 약을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
※ 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(http://www.taiguk.co.kr) 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(https://nedrug.mfds.go.kr) 및 QR코드를 참조하십시오.

의약품 사용 후 부작용 발생 시, 부작용 신고 및 피해구제 신청은 한국의약품안전관리원에 할 수 있습니다.

신청방법 ☎ 1644-6223, 14-3330 | ☐ karp.drugsafe.or.kr

신청대상 의약품 부작용으로 사망, 장애, 질병 피해를 입은 환자 및 유족

보상범위 사망일시보상금, 장례비, 장애일시보상금, 진료비

[제조의뢰 · 판매자] 태극제약(주) 태극제약㈜
경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 123

[제조사] 주노바엠헬스케어 (주)노바엠헬스케어
경상북도 경산시 하양읍 지식산업4로 16-53