

네오신정

【원료약품 및 그 분량】 1정 (210밀리그램) 중**■ 유효성분 :**

파리독신염산염 (KP)	10mg
티아민질산염 (KP)	1.5mg
시아노코발라민1000배산 (KP) (시아노코발라민으로서 6μg)	6mg
리보플라빈 (KP)	1.7mg
아스코르브산 (KP)	60mg
폴산 (KP)	1mg
D-비오틴 (USP)	0.3mg
니코틴아미드 (KP)	20mg
판토텐산칼슘 (KP)	10mg

■ 기타첨가제:

경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 크로스포비돈, 탭실드노란색 (52Y241), 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】 담황색의 원형 필름코팅정**【효능·효과】****1. 다음 경우의 비타민 B₁, B₂, B₆, C의 보급**

- 육체피로
- 임신, 수유기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하시

【용법·용량】 성인: 1일 1회 1정 복용한다.**【사용상의 주의사항】****1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.**

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 만 3개월 미만의 젖먹이
- 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 고옥살산노증환자(hyperoxaluria: 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
- 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 4) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자
- 5) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 체장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 구역, 구토, 설사, 붉은 변
- 2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- 3) 파리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 4) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.

5) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.

6) 우발적으로 과량 복용한 경우

7) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- 3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사지에 영향을 줄 수 있다.

6. 일반적 주의

지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다.

환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관**【사용기한】 제조일로부터 36개월****【포장단위】 1,000정/병****【소비자상담실】 080-811-3011**

- 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변태·오염되거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 약약품판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 "소비자 분쟁해결기준"에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다.
- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 첨부문서 최종 개정연월일(2024.02.08)이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인 할 수 있습니다.
- 제품의 사용기한은 외부 포장에 표기되어 있습니다.
- 부작용보고 및 피해구제신청: 한국의약품안전관리원(14-3330 혹은 1644-6223)

【판매자】**더블유에스메디칼(주)**

서울특별시 영등포구 선유로9

【제조사】**메딕스제약(주)**

전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단6로 170