아프로바스크® 정
(이르베사르탄,암로디핀베실산염)

150/5mg
150/10mg
300/5mg

HANDOK

전문의약품

[원료약품 및 분량]
150/5밀리그램:
이 약 1정(260 mg) 중,
- 유효성분: 이르베사르탄(별규) 150.0 mg, 암로디핀베실산염(EP) 7.0 mg(암로디핀으로서 5 mg)
- 첨가제: 미결정셀룰로오스, 크로스카멜로오스나트륨, 히프로멜로오스, 미결정셀룰로오스, 콜로이드성이산화규소, 스테아르산마그네슘, 오파드라이투명(K03B28796), 정제수

150/10밀리그램:
이 약 1정(260 mg) 중,
- 유효성분: 이르베사르탄(별규) 150.0 mg, 암로디핀베실산염(EP) 14.0 mg(암로디핀으로서 10 mg)
- 첨가제: 미결정셀룰로오스, 크로스카멜로오스나트륨, 히프로멜로오스, 미결정셀룰로오스, 콜로이드성이산화규소, 스테아르산마그네슘, 오파드라이노란색(02G84667), 정제수

300/5밀리그램:
이 약 1정(520 mg) 중,
- 유효성분: 이르베사르탄(별규) 300.0 mg, 암로디핀베실산염(EP) 7.0 mg(암로디핀으로서 5 mg)
- 첨가제: 미결정셀룰로오스, 크로스카멜로오스나트륨, 히프로멜로오스, 미결정셀룰로오스, 콜로이드성이산화규소, 스테아르산마그네슘, 오파드라이노란색(02G82676), 정제수

[성상]
150/5밀리그램: 분홍색의 달걀형 필름코팅정
150/10밀리그램: 분홍색의 달걀형 필름코팅정
300/5밀리그램: 노란색의 달걀형 필름코팅정

[효능·효과]
이르베사르탄 단독요법으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 본태성 고혈압

[용법·용량]
- **성인**
이 약은 1일 1회 1정을 식사와 관계없이 물과 함께 복용한다. 가능하면 매일 같은 시간(예: 아침)에 복용하는 것이 권장된다.
이 약을 투여하기 전에 이르베사르탄으로 용량을 조절할 것이 권장되니, 다음과 같이 혈압이 조절되지 않는 경우 이 약으로 바로 전환하는 것을 고려할 수 있다.
  - 150/5밀리그램: 이르베사르탄 150밀리그램 단독요법으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 환자에게 투여한다.
  - 150/10밀리그램: 이르베사르탄 150밀리그램 단독요법 또는 이 약 150/5밀리그램으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 환자에게 투여한다.
  - 300/5밀리그램: 이르베사르탄 300밀리그램 단독요법으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 환자에게 투여한다.

  이르베사르탄과 암로디핀 단일제품 병용하고 있는 환자의 경우, 복용의 편리함을 위하여 이 약(개개의 주성분 함량이 동일한 복합제)으로 전환할 수 있다.
  일반적으로 24시간 동안의 혈압조절효과는 이르베사르탄 1일 1회 75 mg을 투여하는 것보다 150 mg을 투여할 때 더 우수하지만, 특별한 경우(치료초기, 혈액투석 환자, 혹은 75세 이상의 고령자 등)에는 이르베사르탄 75 mg에 고려될 수 있다. 이르베사르탄의 용량 감량(예: 1일 1회 75 mg)이 요구되는 경우, 이 약의 투여는 권장되지 않는다.
- **고령자**
일반적으로 투여량 조절이 필요치 않으나 75세 이상의 고령자의 경우에는 초회량으로서 이르베사르탄 75 mg을 고려하므로, 이 약을 초기 치료시 투여하는 것은 권장되지 않는다.
- **신장애 환자**
일반적으로 투여량 조절이 필요치 않으나 혈액투석 환자의 경우에는 초회량으로 이르베사르탄 75 mg을 고려하므로, 이 약을 초기 치료시 투여하는 것은 권장되지 않는다.
- **간장애 환자**
일반적으로 경증에서 중등도 간장애 환자에 대한 투여량을 특별히 조절할 필요는 없지만 1일 이르베사르탄 150 mg을 초과하지 않을 것이 권장된다. 중증의 간장애 환자에 대한 이르베사르탄의 임상 경험은 없다.

[사용상의 주의사항]

1. 경고
원칙에게 레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS)에 직접 작용하는 약물들의 투여시, 태아 및 신생아에게 손상 및 사망까지도 일어날 수 있으며, 이러한 사례는 ACE억제제를 복용한 환자에서도 세계적으로 수십 사례가 보고된 바 있다. 따라서 만일 임신으로 확인될 경우 즉시 이 약의 투여를 중단해야 한다.(7.임부 및 수유부에 대한 투여' 항 참조).

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것
1) 이 약, 이 약의 구성성분 또는 다른 디히드로피리딘계 약물(암로디핀 디히드로피리딘계 칼슘채널차단제이다)에 과민반응 병력이 있는 환자
2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
3) 중증 간장애 환자
4) 유전성 혈관부종 환자이거나, ACE억제제 혹은 안지오텐신 II 수용체 길항제 치료시 혈관부종의 병력이 있는 환자
5) 당뇨병이나 중등도-중증의 신장애 환자 (사구체여과율 <60 ml/min/1.73 m²)에서 알리스키렌 함유제품의 병용
6) ACE억제제를 복용중인 당뇨병성 신증 환자
7) 중증의 다발성백혈 혈차증 환자
8) 쇼크 환자(심장성 쇼크 포함)
9) 급성 심근경색 발생 후 혈역학적으로 불안정 심부전 환자
10) 중증의 저혈압 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
1) 고령자
2) 고혈압성 응급 혹은 혈청 칼륨치가 높아지기 쉬운 환자
3) 경증 ~ 중등도 간장애 환자, 특히 담즙 간장벽 및 담즙 정체가 있는 환자(이르베사르탄은 주로 간으로 배설되기 때문에 이러한 환자에서 혈중 농도가 상승할 수 있다.)
4) 대동맥판 및 승모판 협착증 환자 혹은 폐쇄 비대 심근병 환자
5) 허혈성 심장병, 뇌혈성 심장혈관 질환, 뇌혈관 질환 환자(과도한 혈압강하는 심근경색이나 뇌혈류 부족으로 인한 뇌졸중을 일으킬 수 있다.)
6) 혈류량 손실이 있는 환자(나트륨 및 혈류량이 손실된 경우 특히 초회 투여후에 저혈압 증상이 나타날 수 있다.)
7) 신혈관 고혈압 환자
8) 신기능이상 환자(과도한 혈압강하에 의해 신장 기능을 악화시킬 수 있다.)
9) 고혈압을 가진 제2형 당뇨병성 신병증 환자
10) 중증의 혈청성 심부전 또는 신동맥 협착과 같은 신질환 환자
11) 레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS)의 이중차단: 이르베사르탄과 ACE억제제 또는 알리스키렌의 병용투여시 단독투여와 비교하여 저혈압, 고칼륨혈증 그리고 신기능 변화의 위험이 증가한다. 따라서 이 약과 ACE억제제 또는 알리스키렌의 병용은 권장되지 않는다. 병용투여하는 환자의 경우, 혈압, 신기능 및 전해질을 면밀히 모니터링해야 한다.
12) 전신 원자 또는 전신의 병력이 있는 환자(이르베사르탄 사용 시 건선이 악화될 수 있으므로 신중하게 결정해야 한다.)

4. 이상반응
이르베사르탄/암로디핀
이 약에 대한 안전성은 본태성 고혈압 환자 총 428명을 대상으로 한 무작위배정, 이중눈가림, 다기관, 제3상 임상시험 2건(임상시험 301, 302)에서 평가되었다. 본 임상시험에서 4주간의 도입기(run-in) 기간 동안 이르베사르탄(150 mg 또는 300 mg)을 투여받은 후 각각 병용요법(이르베사르탄/암로디핀 150/5 mg, 150/10 mg 또는 300/5 mg) 또는 단일요법(이르베사르탄 150 mg 또는 300 mg)으로 무작위 배정되어 8주간 해당 임상시험용의약품을 투약 받아 비교 평가하였다.
해당 임상시험에서 인과관계와 상관없이 보고된 이상반응은 다음과 같았다.

임상시험 301 이상반응	이르베사르탄 150 mg 및 암로디핀 5 mg 병용투여군 (N=90)	이르베사르탄 150 mg 및 암로디핀 10 mg 병용투여군 (N=91)	이르베사르탄 150 mg 투여군 (N=90)
	N(%)		
감염 및 기생충 감염			
COVID-19	2 (2.22)	2 (2.20)	2 (2.22)
비인두염	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (1.11)
각종 위장관 장애			
변비	1 (1.11)	0 (0.00)	1 (1.11)
상복부 통증	0 (0.00)	1 (1.10)	0 (0.00)
만성 위염	1 (1.11)	0 (0.00)	0 (0.00)
위 식도 역류 질환	0 (0.00)	1 (1.10)	0 (0.00)
치통	0 (0.00)	1 (1.10)	0 (0.00)
각종 신경계 장애			
어지러움	1 (1.11)	0 (0.00)	1 (1.11)
두통	1 (1.11)	0 (0.00)	1 (1.11)
체위성 어지러움	0 (0.00)	1 (1.10)	0 (0.00)
대사 및 영양 장애			
이상 지질 혈증	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (1.11)
고칼륨 혈증	1 (1.11)	0 (0.00)	0 (0.00)
고지혈증	1 (1.11)	0 (0.00)	0 (0.00)
근골격 및 결합 조직 장애			
등의 통증	1 (1.11)	0 (0.00)	0 (0.00)
골절상후	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (1.11)
근육 단일 수축	0 (0.00)	1 (1.10)	0 (0.00)
피부 및 피하 조직 장애			
피부염	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (1.11)
소양증	0 (0.00)	1 (1.10)	0 (0.00)
각종 심장 장애			
두근거림	0 (0.00)	1 (1.10)	0 (0.00)
각종 내분비 장애			
그레이브스 병	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (1.11)
각종 눈 장애			
눈꺼풀 팽창	0 (0.00)	1 (1.10)	0 (0.00)
손상, 중독 및 시술 합병증			
척추 골절	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (1.11)
임상 검사			
혈액 요산 증가	0 (0.00)	1 (1.10)	0 (0.00)

임상시험 302 이상반응	이르베사르탄 300 mg 및 암로디핀 5 mg 병용투여군 (N=79)	이르베사르탄 300 mg 단독투여군 (N=75)
	N(%)	
감염 및 기생충 감염		
COVID-19	2 (2.53)	1 (1.33)
비염	1 (1.27)	0 (0.00)
전신 장애 및 투여 부위 병태		
피로	1 (1.27)	0 (0.00)
안면 부종	0 (0.00)	1 (1.33)
부종	0 (0.00)	1 (1.33)
대사 및 영양 장애		
고칼륨혈증	0 (0.00)	2 (2.67)
이상 지질 혈증	1 (1.27)	0 (0.00)
임상 검사		
혈액내 아미노 전이 효소 증가	0 (0.00)	1 (1.33)
혈액 중성 지방 증가	0 (0.00)	1 (1.33)
감마-글루타밀 전이 효소 증가	0 (0.00)	1 (1.33)
각종 심장 장애		
심방세동	1 (1.27)	0 (0.00)
각종 면역계 장애		
과민성	0 (0.00)	1 (1.33)
각종 신경계 장애		
두통	0 (0.00)	1 (1.33)
장 및 요로 장애		
알부민뇨	0 (0.00)	0 (0.00)
호흡기, 흉곽 및 종격 장애		
기침	1 (1.27)	0 (0.00)
피부 및 피하 조직 장애		
두드러기	0 (0.00)	1 (1.33)

◦ **이르베사르탄**
1) 일반적으로 이르베사르탄의 이상반응은 가볍고 일시적이다.
(1) 고혈압
위약-대조 시험에서 전체적으로 이르베사르탄과 위약에 의한 이상반응은 큰 차이가 없었다. 이상반응이나 실험실적 검사 이상 소견으로 투약을 중단하게 된 이상반응의 발현은 이르베사르탄 투여 환자들보다 위약 투여 환자에서 더 많았다. 이상반응의 발현은 성(性), 나이, 인종, 치료기간 또는 용량(권장용량범위)과는 관계가 없었다.
① 위약-대조 임상시험결과 이르베사르탄 투여군에서 이르베사르탄과의 연관성 여부와 상관없이 관찰된 1 % 이상의 임상적 이상반응은 다음 표와 같다.
a) 상기도 감염, 부비동 이상, 인플루엔자, 인두염, 비염
b) 근골격통(ache, pain), 근육통

이상반응	이르베사르탄 단독요법 (n= 1,965명) (%)	위약 (n= 641명)(%)
호흡기 감염[a]	18.4	18.6
두통	12.3	16.7*
근골격통[b]	7.3	8.4
어지럼	4.9	5.0
피로	4.3	3.7
설사	3.1	2.2
기침	2.8	2.7
구역/구토	2.1	2.8
근골격 외상	1.9*	0.5
홍통	1.8	1.7
소화불량/가슴앓이	1.7	1.1
부종	1.5	2.3
복통	1.4	2.0
발진	1.3	2.0
빈맥	1.2	0.9
불안/신경질	1.1	0.9
상부요로감염	1.1	1.4

* 통계학상 2그룹간에 유의한 차이를 나타냈다. (p < 0.05)

② 두통, 근골격 외상, 홍조를 제외한 다른 이상반응은 위약군이나 이르베사르탄 투여군에서 비슷하게 나타났다. 그러나 두통은 위약군에서 유의하게 더 자주 나타났다. 근골격 외상은 이르베사르탄 투여군에서 유의하게 더 높게 나타났으나 근골격 외상과 관련된 모든 보고서에 따르면 이르베사르탄과는 관계가 없는 것으로 생각된다. 홍조는 이르베사르탄 투여군에서 0.6 %가 나타났고 위약군에서는 나타나지 않았다. 홍조는 투여중단 무관하여 다른 이상반응을 수반하지는 않았다. 그리고 이르베사르탄의 관련성은 밝혀지지 않았다.
③ 장제적으로 중요한 사례들로 1 % 미만에서 발생한 이상반응은 다음과 같으며, 이르베사르탄과의 인과관계 여부를 확인할 수는 없다.
- 전신 : 말초, 오한, 얼굴부종, 협부통
- 심혈관계 : 홍조, 고혈압, 심장잡음, 심근경색, 협심증, 부정맥/전도이상, 심호흡장지, 심부전, 고혈압성 위기
- 피부 : 가려움, 피부염, 반상출혈, 홍반, 두드러기
- 내분비/대사/전해질 : 성기능장애, 성기능변화, 통풍
- 소화기계 : 변비, 구강병소, 위장염, 복부팽만
- 근골격계 : 사지부종, 근육경축, 관절염, 근육통, 홍통, 관절경직, 윤활낭염, 근육약화
- 신경계 : 수면장애, 마비, 기면, 감정장애, 우울증, 감각이상, 진전, 일시적 혀짧, 뇌혈관 사고
- 신장/비뇨생식기계 : 비정상 배뇨, 전립선 이상
- 호흡기계 : 비출혈, 기관지염, 폐렴, 폐출혈, 호흡곤란, 천명
- 혈액/림프계 : 빈혈, 혈소판 감소증, 림프절병증
- 안/이/비/인후계 : 결막염, 청각이상, 이명, 이통, 결막염, 기타 눈의 장애, 눈꺼풀 손상, 귀의 이상

(2) 고혈압을 가진 제2형 당뇨병성 신증병
정상적인 신장기능을 가지며 고혈압 및 미세알부민뇨증이 있는 제2형 당뇨병 환자 590명을 대상으로 한 위약-대조 시험(IRMA 2)에서, 어지럼, 기립저기증, 기립저혈압의 이상반응이 가장 빈번하게 나타났다. 이르베사르탄 300 mg 투여군에서 2.5 % 보고된 반면, 기립빈기증과 기립저혈압은 0.5 % 로 나타났다. 이러한 이상반응에 의해 약물의 투약이 중단되지 않았다.
또한, 단백뇨 = 900 mg/1일, 혈청 크레아티닌수치 1.0 ~ 3.0 mg/dL에 고혈압인 제2형 당뇨병 환자 1,715명을 대상으로 한 위약-대조 시험(IDNT)에서는, 기립성 증상을 제외하고는 함병증이 없는 고혈압 환자들에게서 보고된 이상반응과 유사하게 나타났다. 본 연구에서, 기립성 증상은 이르베사르탄 투여군에서 위약군에서 보다 더 빈번하게 보고되었으며, 어지럼은 이르베사르탄 투여군에서 10.2 %, 위약군에서 6.0 % 보고되었고, 기립현기증은 이르베사르탄 투여 군에서 5.4 %, 위약군에서 2.7 %로 보고되었으며, 기립저혈압은 이르베사르탄 투여군에서 5.4 %, 위약군에서 3.2 %로 각각 보고되었다. 기립성 증상에 의한 약물투여중지율은 다음과 같다 : 어지럼에 의한 약물투여중단율은 이르베사르탄 투여 군에서 0.3 %, 위약군에서 0.5 % 이었으며, 기립현기증에 의해서는 이르베사르탄 투여군에서 0.2 %, 위약군에서 0.0 %로 나타났다. 기립저혈압에 의해서는 약물의 투약이 중단되지 않았다.

2) 실험실적 검사 결과에 대한 영향
(1) 고혈압
대조 임상시험에서, 임상적으로 유의한 어떠한 실험실적 검사 결과의 변화도 관찰되지 않았다. 비록 위약대조군(0.7 %)에 비해서 이르베사르탄 투여군(1.7 %)에서 혈장크레아틴키나아제의 유의한 증가가 보다 자주 나타났으나, 임상적의 않았으며 약물을 중지할 만큼도 아니었으며 임상적으로 근골격계 이상과 관련되어있지도 않았다.
신기능이 정상인 본태고혈압 환자의 경우 이르베사르탄을 투여받아도 실험실적 검사결과에 대한 특별한 모니터링은 필요하지 않다.
(2) 고혈압을 가진 제2형 당뇨병성 신증병
당뇨병성 신증병이 있는 환자를 대상으로 실시한 임상 시험에서, 고칼륨혈증을 제외하고는 고혈압환자의 실험실적 검사 결과와 유사하게 나타났다. 정상적인 신장기능을 가지며 고혈압 및 미세알부민뇨증이 있는 제2형 당뇨병 환자 590명을 대상으로 한 위약-대조 시험(IRMA2)에서, 이르베사르탄 300 mg 투여군의 29.4 % 에서 5.5 mEq/L 이상의 고칼륨혈증이 보고되었으며 위약군에서는 22 %로 나타났다. 고칼륨혈증으로 인한 약물투여중단은 이르베사르탄 투여군에서 0.5 % 로 보고되었다.
또한, 고혈압 및 단백뇨 = 900 mg/1일, 혈청 크레아티닌수치 1.0 ~ 3.0 mg/dL인 제2형 당뇨병 환자 1715명을 대상으로 한 위약-대조 시험(IDNT)에서는 이르베사르탄 투여군에 속한 환자들에게서 고칼륨혈증이 보고되었으며 위약군에서는 2.1 %, 위약군에서는 0.4 % 로 각각 보고되었다.
3) 시판후 경험 : 다른 안지오텐신 II 수용체 길항제와 같이 과민반응(발진, 두드러기, 혈관부종, 아나필락시스성 쇼크를 포함한 아나필락시스성 반응이 보고되었다. 기전은 이르베사르탄에서 매우 드물게 보고되었다. 대부분 이상반응도 시판후 조사시 보고되었다: 쇠약, 설사, 어지럼, 소화불량, 구역, 두통, 이명, 고칼륨혈증, 근육통, 혈장 크레아틴키나아제 증가, 관절통, 빈맥, 간염, 간기능 이상, 위험한자를 가진 환자에서만 보고된 신부전증을 포함한 신기능 손상, 건선, 광민감반응, 빈혈, 혈소판감소증, 저혈압이 보고되었다.

4) 기타 발생가능한 중대한 이상반응
(1) 일차 예방: 알코올, 입술, 인두, 혀 등에 혈관부종이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 치료를 한다.
(2) 고칼륨혈증 : 심각한 고칼륨혈증 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 즉시 적절한 처치를 한다.
(3) 쇼크, 실신, 의식 소실 : 쇼크, 혈압강하에 따른 실신, 의식 소실이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 처가주 느낌, 구토, 의식 소실 등이 나타날 경우에는 즉시 적절한 처치를 한다. 특히 혈액 투석이나 염격한 저염식, 이뇨제 또는 다른 혈압강하제를 투여 중인 환자에서 지용량에서 투여를 시작하고 증량하는 경우에는 환자의 상태를 충분히 관찰하면서 서서히 한다.
(4) 시부전 : 신부전이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
(5) 간기능 장애, 황달 : AST, ALT, ALP, γ-GTP 상승 등의 간기능 장애, 황달이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
(6) 저혈당 : 저혈당(당뇨병 치료중인 환자에서 나타나기 쉬움)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 두려움, 공복감, 식은 땀, 손떨림, 집중력 저하, 경련, 의식 장애 등이 나타난 경우에는 투여를 중지하고 적절한 치료를 한다.
(7) 횡문근융해 : 근육통, 무력감, 크레아틴키나아제(CK) 상승 및 갈색 오줌 미경검로부 상승을 특징으로 하는 횡문근융해가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이러한 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
5) 국내에서 재심사를 위하여 6년 동안 4,480명을 대상으로 실시한 시판 후 조사결과 이상반응의 발현 빈도율은 인과관계 상관없이 3.62 %(162명/4,480례)로 보고되었으며, 이 중 시판 전 임상시험에서 나타나지 않았거나, 시판 전 임상시험에서 나타났지만 인과관계가 확인되지 않았던 이상반응으로 심계항진(3례), 빈비(3례), 호흡곤란(4례), 감각감퇴(3례), 고혈압지방혈증, 불면, 미각둔화이각 2례씩, 구갈, 복부팽만, 구강출혈, 격임증가, HDL감소, 단백증가, 경련, 가려움, 과립구감소증, 백혈구감소증, 발기부전이각각 1례씩 보고되었다.

◦ **암로디핀**
1) 암로디핀은 내약성이 좋다. 고혈압 및 협심증환자에 대한 위약대조 임상시험에서, 가장 흔하게 나타난 이상반응은 다음과 같다:
혈관계 : 홍조
전신 : 피로, 부종
신혈관계 : 심계항진
중추 및 말초신경계 : 현기증, 두통, 졸음
소화기계 : 복통, 오심
임상시험에서 암로디핀과 연관되어 임상적으로 유의한 실험실적검사 이상은 관찰되지 않았다.
2) 시판 후 비교적 적은 빈도로 관찰된 이상반응은 다음과 같다:
전신 : 무력, 권태감, 통증, 체중의 증가/감소
혈관계 : 저혈압, 혈관염
신경계 : 간장항진, 감각저하/감각이상, 말초신경병증, 실신, 미각이상, 진전, 추체외로 장애
생식기계 : 발기기능 장애, 여성형 유방
소화기계 : 메번습관 변화, 구갈간조, 소화불량(위염), 치은 비후, 췌장염, 구토
대사/영양 : 고혈당
근골격계 : 관절통, 요통, 근육경련, 근육통
혈액 및 림프계 : 백혈구감소증, 혈소판감소증
정신계 : 불면, 기분변화
호흡기계 : 기침, 호흡곤란, 비염
피부/부속물 : 탈모, 자반증, 피부변색, 피부병, 두드러기, 독성표피괴사용해
감각기계 : 귀에서 소리가 남, 시각이상
비뇨기계 : 배뇨빈도 증가, 배뇨장애, 야뇨증
간담도계 : 간염, 황달, 간효소치의 상승 등이 매우 드물게 보고되었으며, 이들의 대부분은 담즘 정체와 관련이 있었다. 임원이 필요할 만큼 중증이었던 일부 경우에서는 암로디핀의 사용과 연관이 있다고 보고되었으나, 대부분 많은 경우에서는 암로디핀과의 인과관계가 불명확하다.
드물게 소양증, 발진, 혈관부종, 다형성홍반을 포함한 알레르기 반응이 보고되었다.
3) 다른 칼슘채널차단제에서와 마찬가지로, 다음의 이상반응들이 드물게 보고되었는데 이들이 기저질환으로 인한 것인지 약물에 의한 것인지를 알 수 없었다.
심근경색, 부정맥(서맥, 심실성빈맥, 심방성세동 포함), 흉통
4) 기타 다음과 같은 이상반응이 관찰되었다.
심혈관계 : 때때로 혈압강하, 동방정맥 또는 방실블록, 드물게 복부불쾌감 등이 나타날 수 있다.

소화기계 : 때때로 심와부통, 설사, 묽은 변, 변비 등이 나타날 수 있다.
피부 : 드물게 피부홍통증, 반점상 구진성 발진 등이 나타날 수 있다.
기타 : 때때로 두통, 열감, 냉감적저위, 쇠약 등이 나타날 수 있다.

5. 일반적 주의
1) 간장애 환자에 대한 투여 : 모든 칼슘채널차단제와 마찬가지로 암로디핀의 반감기는 간장애 환자에서 길어졌으며, 이들 환자에 대한 암로디핀의 권장용량은 확립되지 않았다. 그러므로, 이런 환자들은 주의하여 투여한다. 일반적으로 경증 또는 중등도 간장애 환자에게 이르베사르탄의 투여량을 조절할 필요는 없지만 1일 이르베사르탄 150 mg을 초과하지 않을 것이 권장된다.
단, 중등의 간장애 환자에 대한 임상 경험은 없으므로 중증 간장애 환자에게 투여하지 않는다.
이르베사르탄을 포함한 안지오텐신 II 수용체 길항제 투여 중에 중증의 간기능 장애가 나타났다는 보고가 있다. 간기능 검사를 실시하는 등 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
3) 수술 전 24시간은 이르베사르탄을 투여하지 않는 것이 바람직하다.
4) 혈류량 손실이 있는 환자 : 영분제한, 이뇨제의 고용량사용, 설사 및 구토, 혈액투석으로 인한 나트륨 및 혈류량이 손실된 경우 특히 초회 투여 후에 저혈압 증상이 나타날 수 있다. 그러므로 이 약 투여 전에 보정하거나 혹은 기존 이뇨제 치료 용량을 줄이는 것이 권장된다.
5) 신장혈관고혈압 : 양측성 신동맥 협착증 환자 혹은 단독기능 신장의 신동맥 협착증이 있는 환자가 레닌-안지오텐신-알도스테론계에 영향을 주는 약물을 투여받으면 심각한 저혈압 및 신부전증의 위험이 증가한다. 이르베사르탄에서는 보고된 바 없지만, 이르베사르탄은 안지오텐신 II 수용체 길항제이므로 세심한 주의를 기울여야 한다. 또한 이들 환자군에서 신혈류량 감소와 사구체 여과압의 저하에 의해 급격히 신기능을 악화시킬 우려가 있으므로 치료가 부득이하다고 판단되는 경우를 제외하고 사용을 제한하고 사용중은 주의깊게 모니터링해야 한다.
6) 신기능이상 및 신장이식 : 신기능이 레닌-안지오텐신-알도스테론계의 활성에 따라 달라질 수 있는 환자(예, 중증 울혈심부전 환자)는 ACE억제제의 투여로 소변감소 및/또는 진행성 질소혈증 및 급성 신부전 및/또는 사망이 나타날 수 있다. 신장기능상의 환자에게 이르베사르탄을 투여한 경우 혈청 칼륨과 크레아티닌치를 주기적으로 모니터링할 필요가 있다. 신장이식을 최근에 받은 환자에 대한 이르베사르탄의 투여에 대해서는 연구된 바 없다.
7) 고혈압을 가진 제2형 당뇨병성 신장병 환자 : 진행성 신장병이 있는 당뇨환자를 대상으로 한 임상 연구에서, 이르베사르탄의 신장 및 심혈관계에 대한 작용이 모든 세부 환자군에서 일치하지 않았다. 특히, 여성과 유색인종에서 그 효과가 감소했다(전체 연구에서 각각 32 %, 26 %를 차지하는 여성과 흑인 집단에서 신장에 대한 유익성은 명확하지 않지만, 신뇨근을 방어시키는 않았다.
여성에서 위약 투여군과 비교했을 때 비치명적 심근경색의 발생이 증가했고, 암로디핀 투여군과 비교했을 때 비치명적 심근경색과 뇌졸중의 발생이 증가했다. 그러나 이르베사르탄을 투여한 모든 군에서 심부전으로 인한 입원은 감소했고, 여성에서 발생증가의 적절한 이유는 밝혀지지 않았다.
8) 고칼륨혈증 : 레닌-안지오텐신-알도스테론계에 영향을 주는 약물과 같이 이르베사르탄 투여 시 특히 심부전이나 신부전 환자, 당뇨병성 신장병에 의한 현성 단백뇨 환자와 같이 혈청 칼륨치가 높아지기 쉬운 환자에서는 고칼륨혈증이 나타날 수 있다.
위험인자가 있는 환자에서 이 약을 투여할 경우 혈청 칼륨치를 충분히 모니터링할 필요가 있다. 또한 고칼륨혈증 환자들에서는 고칼륨혈증을 악화시킬 우려가 있으므로 지로가 불가피하다고 판단되는 경우를 제외하고 사용을 피한다.
9) 암로디핀은 혈청알도스테론증이 있는 환자는 레닌-안지오텐신-알도스테론계를 억제하지 않기 때문에 이러한 환자에 대한 투여는 권장되지 않는다.
10) 혈관의 탄력과 신기능이 특별히 레닌안지오텐신계의 활동에 영향을 받는 환자의 경우(중증의 울혈심부전 또는 신동맥협착과 같은 신질환), ACE억제제나 안지오텐신 II 수용체 길항제로 치료할 때 급성저혈압, 질소혈증, 빈뇨 또는 드물게 급성 신부전이 나타날 수 있다.
11) 다른 ACE억제제들과 마찬가지로, 이르베사르탄 및 다른 안지오텐신 II 수용체 길항제들은 다른 인종보다는 흑인에게서 혈압저하 작용이 좀 더 약하게 나타나는 것으로 나타났다. 이는 일반적으로 흑인 고혈압 환자들 중에서, 레닌 수치가 낮은 환자의 빈도가 더 높기 때문인 것으로 추정된다.
12) 이르베사르탄 및 암로디핀 각각의 성분에 대해 보고된 약물상호작용은 다음과 같다.
◦ **이르베사르탄**
이뇨제 및 다른 혈압강하제 : 다른 혈압강하제는 이르베사르탄의 강압작용을 증가시킬 수 있으나 이르베사르탄은 다음과 같은 혈압강하제와 안전하게 병용투여할 수 있다. : 베타차단제, 장시간 작용하는 칼슘채널차단제, 티아지드계 이뇨제.
이르베사르탄은 혈청 안지오텐신 II 수용체 길항제으로 세포 사용한 경험이 나타날 수 있다. 또한 이들 환자군에서 신혈류량 감소와 사구체 여과압의 저하에 의해 급격히 신기능을 악화시킬 우려가 있으므로 치료가 부득이하다고 판단되는 경우를 제외하고 사용을 피한다.
13) 칼륨보존성 이뇨제, 칼륨제제, 칼륨함유 소금대용품 : 안지오텐신 II 수용체 길항제와 같이 이르베사르탄 투여 시 특히 심부전이나 신부전 환자, 당뇨병성 신장병에 의한 현성 단백뇨 환자와 같이 혈청 칼륨치가 높아지기 쉬운 환자에서는 고칼륨혈증이 나타날 수 있다.
위험인자가 있는 환자에서 이 약을 투여할 경우 혈청 칼륨치를 충분히 모니터링할 필요가 있다. 또한 고칼륨혈증 환자들에서는 고칼륨혈증을 악화시킬 우려가 있으므로 지로가 불가피하다고 판단되는 경우를 제외하고 사용을 피한다.
14) 혈관의 탄력과 신기능이 특별히 레닌안지오텐신계의 활동에 영향을 받는 환자의 경우(중증의 울혈심부전 또는 신동맥협착과 같은 신질환), ACE억제제나 안지오텐신 II 수용체 길항제로 치료할 때 급성저혈압, 질소혈증, 빈뇨 또는 드물게 급성 신부전이 나타날 수 있다.
15) 다른 ACE억제제들과 마찬가지로, 이르베사르탄 및 다른 안지오텐신 II 수용체 길항제들은 다른 인종보다는 흑인에게서 혈압저하 작용이 좀 더 약하게 나타나는 것으로 나타났다. 이는 일반적으로 흑인 고혈압 환자들 중에서, 레닌 수치가 낮은 환자의 빈도가 더 높기 때문인 것으로 추정된다.
16) 이르베사르탄은 혈청 안지오텐신 II 수용체 길항제로 치료할 때 급성저혈압, 질소혈증, 빈뇨 또는 드물게 급성 신부전이 나타날 수 있다.
17) 다른 ACE억제제들과 마찬가지로, 이르베사르탄 및 다른 안지오텐신 II 수용체 길항제들은 다른 인종보다는 흑인에게서 혈압저하 작용이 좀 더 약하게 나타나는 것으로 나타났다. 이는 일반적으로 흑인 고혈압 환자들 중에서, 레닌 수치가 낮은 환자의 빈도가 더 높기 때문인 것으로 추정된다.
18) 이르베사르탄은 혈청 안지오텐신 II 수용체 길항제로 치료할 때 급성저혈압, 질소혈증, 빈뇨 또는 드물게 급성 신부전이 나타날 수 있다.
19) 암로디핀은 혈장농도 및 기계 조직 식 어지럼이나 피곤감이 나타날 수 있으므로 주의가 필요하다.
20) 치명당 : 이르베사르탄은 저혈당을 유발할 수 있다 (당뇨병 치료중인 환자에게서 나타나기 쉬움). 따라서, 당뇨병 치료제의 용량 조정이 필요할 수 있다.
21) 심부전환자에 대한 투여 : 허혈성 병인이 없는 뉴욕심장학회(NYHA) III, IV등급의 심부전환자에 대한 암로디핀의 장기간, 위약대조시험 (PRAISE-2)에서 암로디핀은 위약과 비교 시 심부전의 악화율에 유의적인 차이가 없음에도 불구하고 폐부종 보고의 증가와 연관이 있었다.
15) 암로디핀은 혈장농도 반감기가 길어 투여를 중지한 후에도 장애 관련 혈압강하작용이 나타나므로, 투여 중지 후 다른 혈압강하제를 투여하는 경우에는 용량 및 투여간격에 주의하고 환자의 상태를 관찰하면서 신중히 투여한다.

6. 상호작용
1) 이르베사르탄과 암로디핀 병용 시 유의한 약동학적 상호작용이 나타나지 않았다. 이 약과 다른 약물과의 약물상호작용에 대한 연구는 실시되지 않았다.
2) 이르베사르탄 및 암로디핀 각각의 성분에 대해 보고된 약물상호작용은 다음과 같다.
◦ **이르베사르탄**
이뇨제 및 다른 혈압강하제 : 다른 혈압강하제는 이르베사르탄의 강압작용을 증가시킬 수 있으나 이르베사르탄은 다음과 같은 혈압강하제와 안전하게 병용투여할 수 있다. : 베타차단제, 장시간 작용하는 칼슘채널차단제, 티아지드계 이뇨제.
이르베사르탄을 포함한 안지오텐신 II 수용체 길항제으로 세포 사용한 경험이 나타날 수 있다. 또한 이들 환자군에서 신혈류량 감소와 사구체 여과압의 저하에 의해 급격히 신기능을 악화시킬 우려가 있으므로 치료가 부득이하다고 판단되는 경우를 제외하고 사용을 피한다.
3) 칼륨 보급제 및 칼륨보존이뇨제 : 레닌-안지