

조제용 일반의약품

BINEX

마로신정

500정

【원료약품 및 그 분량】1정 중

- 유효성분 : 수산화마그네슘(KP) 500mg
노회 건조엑스(EP) 100mg
(히드록시안트라센 유도체(바바로인)로서 20.0mg)
우르소데옥시콜산(KP) 10mg

- 기타 첨가제 : 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 크로스카멜로오나트륨, 포비돈, 폴리에틸렌 글리콜6000, 히프로멜로오스

【성상】 흰색의 타원형 필름코팅정

【효능·효과】

- 변비 · 변비에 따른 다음 증상의 완화 : 식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내이상발효, 치질

【용법·용량】

1회 1정 성인(15세 이상), 1일 3회 식전(식간(식사때와 식사때 사이) 또는 식후)에 복용한다. 다만, 초회는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량(양을 늘림) 또는 감량(줄임)한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
1) 급성 복부질환(충수염, 장출혈, 궤양성 결장염 등) 환자 2) 장폐색(창자막힘) 환자
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약(식품)을 복용하지 말 것.
제산제 또는 우유 섭취 후 1시간 이내
3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
1) 심한 복통(배 아픔) 또는 구역, 구토 환자
2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
3) 신장장애 환자 4) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
5) 직장의 출혈 혹은 장부전의 병력이 있는 사람
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
1) 이 약을 복용함으로써 발진 · 충혈되어 붉어짐, 가려움, 심한 복통(배 아픔), 설사, 구토 등이 나타날 경우
2) 이 약을 복용함으로써 복부불쾌감, 경련이 일어날 경우
3) 1주 정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
2) 장기간 계속 사용시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안 된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 변비의 원인을 조사할 것.
6. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【포장단위】 500정/병

【저장방법 및 사용(유효)기간】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

【제조사】 (주)노바엠헬스케어 경상북도 경산시 하양읍 지식산업4로 16-53

【제조의뢰자】 (주)바이넥스 부산광역시 사하구 다대로 368-3

※ 본 의약품은 의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 의한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 약을 사용하시기 전에 반드시 본 라벨을 읽어주시기 바랍니다.

※ 본 라벨의 개정연월일 이후로 변경된 허가사항은 의약품안전나라(<http://nedrug.mfds.go.kr>) 혹은 당사 홈페이지(<http://www.bi-nex.com>)나 전화(080-263-3151)로 문의하시면 확인하실 수 있습니다.

※ 의약품 피해구제 상담 / 부작용 신고 · 피해구제 상담 : 한국약품안전관리원(14-3330 / 1644-6223)

제품 개봉 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

제조번호 :

사용기한 :

35*18mm



* 개정연월일 : 2024.01.16

2a8040-01

