

혈관 보강제

마더스민정600mg

(디오스민)

【원료약품 및 그 분량】(정 중)

· 유효성분: 디오스민(KP) 600mg
· 기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산, 콜로이드성아산화규소, 탭실드분홍색(1P1178), 탭크, 탭실드클리어(92C569)

【성상】 분홍 또는 연분홍의 원형 필름코팅정제

【효능·효과】

1. 정맥부전과 관련된 증상의 개선: 다리 중압감, 통증
2. 모세혈관 취약증에 의한 장애의 보조치료
3. 치질과 관련된 징후의 치료

【용법·용량】

정맥 부전: 디오스민으로서 1회 600mg 1일 1회 식사 시 복용한다.

치질: 디오스민으로서 1회 600mg 1일 2 ~ 3회(1,200~1,800mg) 식사 시 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 이 약 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 수유부
- 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것

- 1) 임부(필요한 경우에만 이 약 투여가 고려되어야 한다.)
- 2) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 체장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것

- 1) 이 약 투여 후 소화장애가 나타날 수 있으나, 치료를 중단하는 경우는 드물다.

4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 이 약을 투약해도 다른 항문 질환에 대한 특별한 치료법이 면제되지 않는다.
- 2) 이 약은 오랜 기간 투약하지 말아야 한다.
- 3) 증상이 빨리 나아지지 않으면, 항문검사를 실시해야 하며 치료를 재검토해야 한다.

5. 일반적 주의

- 1) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 30정/병, 60정/병, 100정/병, 300정/병, 500정/병, 10정/피티피(10정/PTP x 1), 60정/상자(10정/PTP x 6), 120정/상자(10정/PTP x 6) x 2)

【사용기한】 외부포장참조

【제조/외곽지】 (주)마더스제약 / 경상북도 경산시 진량읍 공단6로24길 18

【제조자】 메디스제약(주) / 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 170

※ 제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과 되었는데 변질, 변색, 오손된 제품이 발견될 경우는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.

※ 작성일자(2023.12.20) 이후 변경된 내용이나 자세한 품목명가 또는 신고사항은 본사(070-7457-8819)로 문의하십시오. 또는 식품의약품안전처의약품 통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

작성일 : 2023년 12월 20일

40년 이상 엄마의 마음으로 여러분의 건강을 지켜온



(주)마더스제약

Since 1974 -

MOTHER'S PHARMACEUTICAL CO.,LTD.