

전문 의약품

사르린정 30밀리그램

(니세르골린)

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

- 유효성분 : 니세르골린(EP) 30.00mg
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이노란색(03B620121), 인산수소칼슘수화물, 크로스카르멜로스나트륨

[성상]

노란색의 원형 필름코팅정

[효능·효과]

일차성 퇴행성 혈관치매 및 복합성치매와 관련된 다음 치매증후군의 일차적 치료 : 기억력 손상, 집중력장애, 판단력장애, 적극성 부족

[용법·용량]

성인 : 니세르골린으로서 1일 1회 30 mg을 식전에 경구투여한다. 이 용량에서 원하는 효과가 나타나지 않을 경우 60 mg까지 증량할 수 있다. 증상이 호전 된 후 감량이 가능하다. 신장기능에 이상이 있는 환자의 경우 (혈청 creatinine >175 µmol/L (2 mg/dL)는 감량하여 투여한다.

[사용상의 주의사항]

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 이 약 또는 맥각알칼로이드에 과민반응 환자
 - 급성 심근경색 환자
 - 급성 출혈 환자
 - 교감신경효능약을 투여받고 있는 환자
 - 현저한 서맥 환자(< 50 회/분)
 - 두개내출혈 후 지혈이 끝나지 않은 환자
 - 기립조절장애 환자

- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 경증의 서맥 환자
 - 신기능장애 환자

3. 이상반응

- 소화기계 : 드물게 식욕부진, 설사, 변비, 구역, 구토, 산재성 상부 복통 또는 경련, 구갈 등이 나타날 수 있다.
- 간장 : 드물게 ALT, AST 상승 등이 나타날 수 있다.
- 순환기계 : 드물게 어지럼, 기립조절장애, 고혈압, 혈중요산의 상승, 혈압강하 등이 나타날 수 있다.
- 정신신경계 : 드물게 졸음, 권태감, 두통, 이명, 피로, 불면 등이 나타날 수 있다.
- 과민반응 : 드물게 발진, 두드러기, 가려움, 홍조, 열감 등이 나타날 수 있다.
- 시판후 4년 동안 국내에서 811명의 환자를 대상으로 이 약의 재심사를 위한 사용성적조사를 실시한 결과, 발현된 이상반응은 22명에서 30건(3.70 %)이며, 시판후 새로이 나타난 이상반응 중 이 약과 인과관계가 있을 수 있는 것으로는 악몽, 기분이상, 소화불량(각 1건)이 있다.

4. 일반적 주의

- 이 약과 다른 혈압강화제를 병용하는 경우에는 혈압강화작용을 증가시킬 수 있으므로 혈압을 자주 확인한다.
- 요산의 대사와 배설에 영향을 미칠 수 있으므로 고요산혈증환자 또는 과거 통풍의 병력이 있는 환자는 주의하여 투여한다.
- 이 약을 복용한 후 운전이나 기계조작을 주의하여야 한다.

5. 상호작용

- 이 약은 혈압강화제의 효과를 상승시킬 수 있다.
- 이 약은 CYP450 2D6를 통해 대사되므로 동일한 대사경로를 갖는 약물과 상호작용이 나타날 수 있다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 동물실험에서 고용량 투여시 배자독성 기형을 유발한 보고가 있다.
- 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 치료상의 유익성이

- 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- 동물실험에서 유증으로의 분비가 보고되었으므로 수유중에는 투여를 피하고 부득이한 경우에는 수유를 중단한다.

7. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

8. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다.

9. 과량투여시의 처치

과량투여시 일시적으로 혈압이 낮아질 수 있다. 필요한 경우 혈압변화를 측정하는 등 필요한 조치를 한다.

10. 보관 및 취급상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

11. 의약품동등성시험 정보 ^{주1}

가. 시험약 니세온정30밀리그램(니세르골린)[환인제약(주)]과 대조약 사미온정30밀리그램(니세르골린)[일동제약(주)]을 2×2 교차시험으로 각 1정씩 건강한 성인에게 공복 시 단회 경구투여하여 43명의 혈중 니세르골린 대사체(MDL)를 측정한 결과, 비교평가항목치(AUC_t, C_{max})를 로그변환하여 통계처리하였을 때, 기하평균비율의 90% 신뢰구간이 80.00~125.00%이내로서 생물학적으로 동등함을 입증하였다.

구분		비교평가항목		참고평가항목	
		AUC _{0-36hr} (ng·hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
대조약	사미온정 30밀리그램 (니세르골린) [일동제약(주)]	576.4 ± 92.6	60.43 ± 18.79	2.67 (2.00 ~6.00)	10.50 ± 1.10
	니세온정 30밀리그램 (니세르골린) [환인제약(주)]	588.9 ± 92.4	63.38 ± 17.97	2.67 (1.50 ~6.00)	10.46 ± 1.12
기하평균비율의 90%신뢰구간 (기준 : 80.00 ~ 125.00%)		101.02 ~ 103.56%	102.24 ~ 109.13%	-	-
(AUC _t , C _{max} , t _{1/2} : 평균값±표준편차, T _{max} : 중앙값(범위), n=43) MDL : 10-methoxy-6-methylergoline-8beta-methanol (10-메톡시-6-메틸에르고폴린-8β-메탄올) AUC _t : 투약시간부터 최종혈중농도 정량시간까지의 혈중농도-시간곡선하면적 C _{max} : 최고혈중농도 T _{max} : 최고혈중농도 도달시간 t _{1/2} : 말단 소실 반감기					

주1. 이 약은 환인제약(주) 니세온정30밀리그램(니세르골린)과 동일한 원료를 사용하여 동일한 제조방법으로 전공정을 환인제약(주)에 위탁 제조하였음.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 30 정/병, 100 정/병

[제조외곽지] 하나제약(주) 경기도 화성시 향남읍 제약단지로 13-39

[제조자] 환인제약(주) 경기도 안성시 공단로 50

- ※ 의약품용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 하나제약(주) 홈페이지(www.hanaph.co.kr)를 참조하세요.
- ※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입하였을 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 소비자 상담전화 : 080-577-8004(수신자 요금부담서비스)
- ※ 부작용 피해구제 신청은 한국 의약품 안전관리원(1644-6223, 14-3330)으로 문의바랍니다.

작성 연월일 : 2024. 01. 10. <M01>

하나제약구식회사
하길공장 : 경기도 화성시 향남읍 제약단지로 13-39