

투월스정

근육경련과 혈액순환을 한번에!

일반의약품

【원료약품 및 분량】 1정(1234mg) 중

▶ 유효성분	
신화마그네슘(KP)(마그네슘(으)로서 250mg)	414.53mg
리보플라빈(KP)	20mg
메코발라민(KP)	1000μg
셀레늄함유건조효모(KP)(셀레늄(으)로서 27μg)	50mg
피리독신염산염(KP)	20mg
토코페롤아세테이트 2배산(KP)(비타민E(으)로서 100IU)	200mg
감마-오리자놀(KP)	5mg

- ▶ 첨가제 : 탭실드칼색(적색산화철, 산화티탄)
▶ 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 히드록시프로필셀룰로오스, 크로스포비돈, 경질무수규산, 스테아르산마그네슘

【성상】 갈색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】

○ 다음 경우의 비타민(E, B₂, B₆)의 보급

- 육체피로 - 임신, 수유기 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하시 - 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
- 말초혈행장애 및 갱년기 시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저막·수족냉증(손발이 차가움)
- 다음 증상의 완화 : 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

【용법·용량】 만 15세 이상 및 성인 1일 1회, 1회 1정 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 2) 만 12개월 미만의 젖먹이 3) 심한 증상의 신부전 환자 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
1) 인산염, 칼슘염, 경구(먹는, 복용하는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제
2) 레보도파
3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 3) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자 4) 심장·순환기계 기능 장애 환자 5) 신장(콩팥)장애 환자 6) 저단백혈증 환자 7) 임부 8) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 황장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 붉은 반점, 설사, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다. 3) 에스트로겐을 포함한 경구(먹는, 복용하는)용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있다. 4) 피라독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있다. 5) 폴산이 부족한 환자에게 비타민B₆를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다. 6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. 7) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용·사용) 투여 시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것 8) 우발적으로 과량 복용한 경우 9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 일반적주의

지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다.

환자가 다른 정수용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다. 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전후에는 피할 것.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 상자60정/병, 120정/상자(60정/병×2)

【제조·의뢰자】 한솔신약(주) 충북 음성군 금왕읍 청평길 2-11

【제조자】 메덱스제약(주) 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 170

【판매자】 일양약품(주) 경기도 용인시 기흥구 하갈로 110

※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 제품에 대한 기타 자세한 사항은 본사(043)881-6333로 문의하시거나 또는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하세요.

※ 부작용 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

제정연월일 : 2024.01.10