

하루 한 알, 고효량 은행잎 추출물

징코드® 정 (은행엽건조엑스) 240mg



사용 전에 사용설명서를 주의 깊게 읽어 보십시오.
사용설명서를 반드시 제품과 함께 보관하십시오.

【원료약품 및 그 분량】 - 1정 중 -

- 유류성분 : 은행엽건조엑스(EP) 240mg
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유)
- 첨가제(타르색소) : 적색40호, 청색6호, 황색203호
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산나트륨, 오파드라일QX(녹색32A600008), 옥수수전분, 콜로이드성아산화규소, 크로스카멜로오스나트륨, 툴코

【성 상】 녹색의 정방형 필름코팅정

【효능·효과】

치매, 기억력 감퇴, 현기증/동맥 경화 증상과 같은 증상이 동반되는 정신 기능저하

【용법·용량】

성인 : 은행엽건조엑스로서 1회 240mg, 1일 1회 1정 복용합니다.

식사와 관계없이 복용할 수 있습니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용) 마십시오.

1. 은행엽건조엑스 또는 이 약의 다른 성분에 대한 과민증이 있는 환자
2. 어린이와 청소년에서 이 약의 복용(사용)에 대한 연구가 충분하지 않습니다.
따라서 이 약은 18세 미만의 어린이와 청소년에게 사용해서는 안 됩니다.
3. 임신부
4. 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내증(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 이 약을 복용(사용)하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지마십시오.

1. 항응고제 : 헤파린, 헤파린, 클로피도그렐, 아세틸살리실산 및 기타 비스테로이드성 항염증제를 병용투여하며 복용(사용)하는 경우, 이들의 약효가 강화되는 것을 배제할 수 없습니다.
2. 다른 약물들과 마찬가지로 이 약도 시트코플 P40, 3A4, 1A2, 2E1, 2C9를 통해 다양한 다른 약물의 대사에 영향을 미치는 것을 배제할 수 없으며, 효능 및/또는 효력 지속 시간을 변화시킬 수 있습니다. 이 약을 나타내면 및 달타이젠과 같은 칼슘채널차단제와 병용투여하며 복용(사용)할 경우 생체이용률이 영향을 미침으로써 이들 물질의 혈중 수준이 더 높아질 위험이 있습니다. 경우도 대조판과 병용투여하며 복용(사용)할 경우 배설에 영향을 가짐으로써 낮은 혈중 수준이 나타날 위험이 있습니다. 따라서 주의하게 모니터링하고 용량을 조절해야 합니다.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오.

1. 출혈 장애가 있거나 출혈의 위험을 증가시키는 약물을 복용(사용)하고 있는 환자는 의학적 조언을 구해야 합니다.
2. 수술 전(모유로 이행여부 알려지지 않음)
3. 이 약을 복용(사용)하여 간질 환자의 추가 발작이 촉진되는 것을 배제할 수 없습니다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오.

당당성 기능저하에 침범물자를 소지하십시오.

1. 이 약을 복용(사용)하면 출혈 위험이 증가할 가능성이 있으므로 안전을 위해 수술 전 최소 36시간 전에 이 약의 복용(사용)을 중단해야 합니다.
2. 복용기간은 증상의 정도에 따라야 하며 최소 8주 이상 지속되어야 합니다. 3개월 후 증상이 호전(나비)되지 않거나 증상이 악화되면 의에게 복용(사용)을 지속해도 되는지 확인해야 합니다.

3) 이상반응

- 위장 장애 : 오심(구역) 등의 위장관 증상.
- 신경계 : 매우 드물게 두통, 불면증, 불안, 혼란
- 피부 : 매우 드물게 알레르기 반응에 피부 홍반(붉은 반점, 부어오름, 가려움증), 알레르기성 쇼크가 있을 수 있습니다. 장기 사용의 경우 출혈이 알려진 사례가 보고되었습니다.
- 4) 국내지발적 이상사례 보고자료(1989~2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의학 문에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났습니다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아닙니다.
 - 어지러움
 - 어지러움
- 5) 아나필락시스 반응은 아나필락시스 반응 보고가 있습니다. 다만, 이로써 해당성분과 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아닙니다.

5. 기타 약의 복용(사용)시 주의할 사항

이 약은 고효량 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고효량 환자에는 투여하지 않습니다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하도록 주의합니다.
- 2) 약물을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 약물의 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 약물의 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관합니다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(10~30℃)보관

【포장단위】 30정/정, 90정/정

【사용기간】 제조일로부터 36개월

제조회사 : 대웅바이오(주) / 경기도 안성시 공단로 69

제 조 자 : 동명약국 / 경기도 화성시 제곡로 321 120

※ 본 약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기간이 지났거나 변질, 변패, 오염되었거나 손상된 약품들은 공정차에 의한 고시소지자 분해해결 기준에 의거 구입한 약국 및 약품판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

※ 정상적인 약품 사용에도 불구하고 약품물 부작용으로 인하여 사망, 장애, 질병 등 피해를 입은 환자분께서는 부작용 피해구제 신청을 한국약물관리(안전관리)44-3330, 844-6223으로 할 수 있습니다.

대웅바이오(주)

작성 연월일 : 2024. 02. 14

최종 개정 연월일 : 2024. 02. 14

※ 이 첨부서 개정 연월일 후 변경된 내용은 대웅바이오 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

※ 대웅바이오 홈페이지(www.daewoongbio.co.kr)

소지자 상담 전화번호(080-789-0787)