

파워비큐 콘티뉴 800정

일반의약품

복용하시기 전에 설명서를 주의깊게 읽어보시고 반드시 제품과 함께 보관하십시오.

【제품명】 파워비큐 콘티뉴800정

【원료약품 및 그 분량】 1정(1,488mg) 중

· 유효성분 : 콘드로이틴설페이트나트륨(KP)	800mg
벤포티아민(B ₁)(KP)(티아민염산염으로서 36.15mg)	50mg
니코틴아미드(B ₃)(KP)	30mg
피리독신염산염(B ₆)(KP)	50mg
판토텐산칼슘(B ₅)(KP)	15mg
리보플라빈(B ₂)(KP)	6mg
비스베타인(B ₄)(KP)(티아민염산염으로서 8.75mg)	10mg
메코발린(B ₁₂)(KP)	1mg
산화마그네슘(KP)(마그네슘으로서 30.16mg)	50mg
시트르산칼슘수화물(USP)(칼슘으로서 21.08mg)	100mg
이노시톨(KP)	20mg
산화이연(KP)(이연으로서 4.02mg)	5mg
콜린타르타르산염(발규)	20mg
콜레칼시페롤(D ₃)(F)(비타민D로서 1,000IU)	10mg

· 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물

· 기타 첨가제 : 경질무수규산, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 정제수, 합성스테아르산(29B10 93)

【성상】 갈색의 타원형 필름코팅정

【효능·효과】

1. 다음 경우의 비타민 D, B₁, B₂, B₆ 의 보급

- 육체피로 - 임신 · 수유기 - 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시 - 발육기 - 노년기 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다. · 뼈, 이의 발육불량 · 구루병의 예방 · 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등) · 각기 · 눈의 피로 · 다음 증상의 완화 : 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

【용법·용량】 만 19세 이상 성인 : 1일 1회, 1회 1정 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 3) 만 12개월 미만의 젖먹이(미네랄 함유제제)
- 4) 신장결석 환자
- 5) 심한 증상의 신부전 환자
- 6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해 효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

경남제약(주)

첨부문서 작성연월일: 2024. 04. 05

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
(1) 비타민D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
- 3) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
- 4) 신장장애 환자
- 5) 저단백혈증 환자
- 6) 강심배당체를 투여 중인 환자
- 7) 신장결석 병력이 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의 할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 :
구역, 구토, 설사, 묽은 변, 식욕부진, 복부팽만감, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부 발진, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 폐부종, 어지러움, 얼굴 · 다리 종창(부기), 홍반, 두드러기, 습진, 발진, 반구진성 발진, 가려움, 부종, 부종 · 수분저류(신부전 또는 심부전 환자)
- 2) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 3) 폴산이 부족한 환자(예 비타민 B₁₂를 1일 10 μ g 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- 4) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- 5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 6) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
- 7) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 8) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
- 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
- 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- 3) 오용·잘못 사용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

【표장단위】 30 정/병, 60 정/상자(30 정/병×2)

【제조(외지) 경남제약(주) 충청남도 아산시 신창면 서부남로790번길 49

【제조지】 메디스제약(주) 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단6로 170

【소비자상담전화】 080-232-8600, www.kyungnampharm.com

【기타주의】

- ※ 허가된 효능 · 효과와 다른 용도로 사용시에는 예상하지 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.
- ※ 사용(유효)기한이 경과한 제품은 복용(사용)하지 마시기 바랍니다.
- ※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사 · 약사 및 자사 소비자 상담실로 문의하시기 바랍니다.
- ※ 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 또는 오염된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회고시 “소비자분쟁해결기준”에 의거하여 구입한 곳에서 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.
- ※ 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템 「<https://nedrug.mfds.go.kr>」 → 의약품 등 검색」을 참조하시기 바랍니다.
- ※ 부작용 보고 및 피해구제 신청: 한국약품안전관리원(1644-6223)

경남제약(주)

MEPP1214-001