

날짜	2024년04월 24일	기타	모서리 라운드 1R / 례타입	● 재질 및 색상, 수량 확인해주세요. ● 전화번호, 주소 등 시안 내 중요내용 반드시 확인해주세요. ● 빠진글자(내용), 틀린글자(내용), 위치 확인해주세요. ● 같은 데이터라도 인쇄할 때마다 색상차이가 생길 수 있습니다. 색상이 진하고(오차범위 +5~10%) 흐림 정도(오차범위 -5~10%)로는 재작업이 진행될 수 없습니다. 예) 이전 발주는 조금 진하게 인쇄되고 이번 발주는 조금 흐리게 인쇄되었다면 그 편차는 10~20% 정도로 고객님께서 생각하신 것과 다를 수 있습니다. ※ 상기 사항의 확인 실수로 인한 책임은 당사에 없음을 고지합니다. 유의하시기 바랍니다.
고객사		색상 · 폰트	 4원색 —— 칼선(인쇄되지 않습니다.)	
제품명	툴스블라인 500정			
규격	200×75mm			
재질	아트지			
수량				
※ 인쇄전행 전 시안 확인을 원칙으로 하며, 고객사에서 시안 승인 후 진행한 인쇄 결과물에 대하여 당사에는 책임이 없음을 고지합니다. 정확한 검토 부탁드립니다.				

전문의약품

200 mm

75 mm

NBK

일반의약품

500정

툴스블라인정

(결정트립신, 브로멜라인)

【원료약품 및 그 분량】 1정 중 ● 유효성분: 결정트립신 (USP) 1mg (2,500(USP트립신단위))(동물유래성분: 소-췌장(이자)), 브로멜라인 (KP)40mg(20,000(브로멜라인단위)) ● 첨가제(타르색소) : 청색1호, 황색 203호, 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(소-우유) ● 기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 폴리비드성아산화규소, 크로스포비돈, 탭월드 흰색(11W401), 탭월드 녹색 319G726 【성상】 연녹색의 원형 장용성 필름코팅정 【효능·효과】 다음 질환 및 증상의 염증성 부종(부기)의 완화: 수술 및 외상(상처)후, 유즙울체(젖고임) 【용법·용량】 성인 : 첫날 1회 2정, 1일 4회, 이후 유지량으로 1회 1정, 1일 4회 복용한다. 체내에서의 작용기전은 아직 해명되지 않은 점이 많고 용량, 효과 관계도 밝혀진 것이 아니므로 목적 없이 투여하지 않는다. 【사용상의주의사항】 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다. 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것. 1) 혈액응고 이상 환자 2) 심한 간장애 또는 신장애(신장(콩팥)장애) 환자 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(임신중 투여에 관한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌)한다고 판단되는 경우에만 투여한다.) 4) 항응고제를 투여하고 있는 환자(병용(함께 복용(사용))투여에 의해, 항응고제의 작용이 증강될 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 신중히 투여한다. 3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 과민반응 : 발진, 발적(충혈되어 붉어짐) 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 2) 소화기계 : 설사, 변비, 때때로 식욕부진, 배가 거북함, 구역, 구토 등의 증상이 나타날 수 있다. 3) 혈액계 : 드물게 코피, 혈액가래 등의 출혈 경향이 나타날 수 있다. 4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 5. 저장상의 주의사항 1) 어린 이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.

2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오염(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것. 【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관 【사용(유효)기간】 제조일로부터 36 개월 【소비자상담】 080-957-7190 【취급상의 주의사항】 ※본 의약품은 KGMP(의약품 제조 및 품질관리기준)에 의하여 엄격한 관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품이 발견된 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다. ※ 의약품을 복용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하여야 합니다. ※ 이 첨부문서 개정연월일 이후 변경된 내용 및 기타 자세한 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템 (<http://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다. ※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)에 알려주시기 바랍니다. 작성일자 : 2024.04.24

【제조번호】

【사용기한】

35X18mm



8800548015618



HDPE
무기 LLDPE
재질용이약품

2B112-00