

※ 이 약을 사용하기 전에 반드시 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며 첨부문서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.
첨부문서 작성일자 : 2024년 02월 01일

일반의약품

효과빠른 복합지사제 듀오스탑 캡슐

원료약품 및 그 분량 1캡슐(397mg) 중

- 유효성분 : 베르베린탄닌산염(KP)(무수물로서 베르베린 14.8mg) 50mg
비스무트차질산염(KP)(비스무트로서 73mg) 100mg
우르소데옥시콜산(JP) 2mg
스코폴리아엑스10배산(KP)(총알칼로이드(히오스시아민 및 스코폴라민)으로서 45 μ g) 50mg
- 첨가제(타르색소) : 황색 5호, 황색 203호
- 첨가제(동물유래) : 유당수화물(소, 우유)
- 기타 첨가제 : 경질무수규산, 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 캡슐제

성 상 옅은 황갈색의 분말이 든 상부 노랑, 하부 미황색의 경질캡슐제

효능·효과 설사, 복통(배아픔)을 수반하는 설사, 체합, 묽은 변, 토사

용법·용량 만 15세 이상 : 1회 2캡슐, 1일 3회 복용
만 8세 이상 ~ 만 15세 미만 : 1회 1캡슐, 1일 3회 복용
복용 간격을 4시간 이상으로 한다.

사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 산생아
 - 만 7세 이하의 어린이
 - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
위장진통 · 진경제
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.
 - 약으로 알레르기 증상(발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람
 - 발열을 수반하는 설사 환자, 고령자, 혈변 환자 또는 점액변이 계속되는 환자
 - 위 · 십이지장궤양등이 있는 환자
 - 어린이
 - 다른 약물을 복용하고 있는 사람
 - 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 이 첨부문서를 소지할 것.

- 이 약을 복용함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움 등)이 나타나는 경우
- 이 약을 복용하는 동안 드물게 입이 마르는 증상이 나타나는 경우
- 여러차례간 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
- 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여할 것.
- 급성의 심한 설사를 할 경우 또는 구역, 복통(배아픔), 복부팽만 등의 증상을 수반하는 설사를 할 경우에는 이 약으로 무리하게 설사를 멈추게 하면 오히려 병을 악화시킬 수 있으므로 이러한 경우에는 투여에 대하여 약사 또는 의사와 상의한다.
- 복용시에는 음주하지 말 것.
- 3일 이상 계속하여 복용하지 말 것.

6. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

포장단위 10캡슐(10캡슐/PTP)

저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

사용기간 제조일로부터 36개월

소비자상담실 080-708-8070 / 수신자 부담 전화

판매원 보령컨슈머헬스케어(주) / 서울시 종로구 창경궁로 136

제조외의자 (주)다산제약 / 충청남도 아산시 도고면 덕암산로 381

제조원 (주)한국파비스제약 / 경기도 안산시 단원구 산단로83번길 127

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품일 경우에는 구입처에서 교환해드립니다.

※ 의약품은 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하시고, 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

※ 작성일자 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>) 에서 확인할 수 있습니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)