

시트룰린으로 기능무력증을 가 뱌 게

에너지 정

(시트룰린말산염)

일반의약품 조제용

180정

【원료약품 및 그 분량】 이 약 1정 중

- 유효성분 : 시트룰린말산염(별규) 500mg
- 첨가제(타르색소) : 청색2호, 황색5호, 황색203호
- 기타첨가제 : 메타규산알루미늄산마그네슘, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 침강탄산칼슘, 크로스포비돈, 탈크, 탭실드주황색(2901491), 탭실드흰색(11W001)

【성상】 주황색의 타원형 필름코팅정제

【효능·효과】 기능 무력증의 보조치료

【용법·용량】 성인 : 시트룰린말산염으로서 1회 2정, 1일 3회 복용한다.
소아(6세이상) : 시트룰린말산염으로서 1회 2정, 1일 2회 복용한다.
단, 4주 이상 투여하지 않는다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 6세 미만의 유아
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 임부(동물실험에서 기형발생은 보고되지 않았으며 임상에서도 기형발생 또는 태아독성이 보고된 바 없으나 임신 중 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임신 중에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.) 2) 수유부(유즙 분비에 대한 자료가 없으므로 이 약은 수유부에게 투여하지 않는 것이 바람직하다.) 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것. 4) 이 약은 황색203호(퀴놀린엘로우 WS)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다. 5) 이 약은 황색5호(선셋엘로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

1) 정해진 용법 · 용량을 지킬 것. 2) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 복용시킬 것. 3) 드물게 투여초기에 약한 위장관 장애가 나타날 수 있다.

4. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【제조의뢰자】 영일제약(주) 충청북도 진천군 진천읍 문화12길 6-1

【제조사】 (주)김스제약 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명14로 106

※ 소비자상담실 : 02-522-7005

※ 의약품정보참조 : <https://nedrug.mfds.go.kr>

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질 · 변패 · 오염되었거나 손상된 의약품은 공정거래위원회 고시(소비자분쟁해결기준)에 의거, 구입한 약국 및 의약품판매업자를 통해 교환 또는 환불하여 드립니다.

※ 의약품 부작용 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(14-3330(상담) 또는 1644-6223(신고 및 상담))



영일제약(주)



제조번호 :

사용기한 :

착인공간
40x20
(인쇄시 문구 삭제)

KL-00