

일반의약품 정보

이 약을 사용하기 전 반드시 아래의 내용을 확인하세요.

[유효성분] 1정 (234mg)중

■ 트리메부틴말레산염(KP) 200mg

[효능·효과] 1. 주 효능 효과 1) 식도역류 및 열공(구멍)헤르니아(탈장), 위·십이지장염, 위·십이지장궤양에 있어서의 소화기능이상(복통(배아픔), 소화불량, 구역, 구토) 2) 과민성대장증후군 및 경련성 결장 3) 소아 질환: 습관성 구토, 비감염성 장관통과장애 (변비, 설사)

[용법·용량] 성인: 트리메부틴말레산염으로서 1회 100~200mg 1일 3회 식전에 경구투여한다(먹는다). 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것. 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 부작용 1) 소화기계: 드물게 변비, 설사, 복명(창자 가스소리), 구역, 구토, 소화장애, 구갈(목마름), 구내(입안)마비감 등이 나타날 수 있다. 2) 순환기계: 드물게 심계항진(두근거림)이 나타날 수 있다. 3) 정신신경계: 드물게 피로감, 졸음, ➡

현기(어지러움), 권태감, 두통 등이 나타날 수 있다. 4) 간장: 드물게 GOT, GPT 상승이 나타날 수 있다. 5) 과민증: 드물게 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.

3. 임부에 대한 투여 임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌)한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

4. 수유부에 대한 투여 수유중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 수유중인 부인에는 투여를 피하고 부득이 투여시는 수유를 중지한다.

5. 다음 환자에는 신중히 투여할 것. 이 약은 황색 4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알러지 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기한] 용기 측면표시일까지

[첨가제] ●첨가제(타르색소): 황색4호 ●첨가제(동물유래성분) 유당수화물(소, 우유) ●기타 첨가제: 경질무수규산, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 크로스포베돈, 히드록시프로필셀룰로오스

[성상] 연한 노란색의 원형정제 **[포장단위]** 10정 / PTP

[제조의뢰자] 메디스제약(주) / 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단6로 170

[제조사] 진양제약(주) / 강원특별자치도 원주시 지정면 신평로 34