

사용상의 주의사항

1. 다음 사람은 복용 전에 의사, 약사와 상의 할 것.

- 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지천식, 알레르기성 비염(코염), 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람.
- 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람.
- 3) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(젖먹이), 유아 및 어린이 (14세 이하).
- 4) 간장, 신장(콩팥), 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람, 또는 고열이 있는 사람.
- 5) 고령자(노인).
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부.
- 7) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람.

2. 복용할 때 다음 사항을 주의할 것.

- 1) 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 다음 약들과는 동시에 복용하지 말 것.
 - 다른 해열진통제, 감기약, 진정약 등
- 3) 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 지도·감독 하에 복용시킬 것.

3. 복용 중 또는 복용 후에는 다음 사항을 주의할 것.

- 1) 복용하는 동안 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
- 2) 수회(여러 차례) 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
- 3) 장기 연용(계속 복용)하지 말 것.

4. 보관 및 취급상의 주의

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.
- 2) 직사일광(햇볕)을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.