

| 일반의약품                                                                                                  |                                                                                                 | 수정<br>횟수                                                                          | 09                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 수정일                                                                                                    | 2024. 06. 04                                                                                    |                                                                                   |                                          |
| 제품명                                                                                                    | 멀티속정                                                                                            |                                                                                   |                                          |
| 분류                                                                                                     | 핵자형 병 라벨                                                                                        |                                                                                   |                                          |
| 규격(mm)                                                                                                 | 165×62                                                                                          |                                                                                   |                                          |
| 후가공                                                                                                    | 코팅<br>없음                                                                                        | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/>                 |
| 수정코드                                                                                                   | P2405-01                                                                                        |                                                                                   |                                          |
| COLOR                                                                                                  | <div> 4도</div> |                                                                                   |                                          |
| 특이사항                                                                                                   | 핵자형 스티커 접지                                                                                      |                                                                                   |                                          |
| <div>* 반드시 수정일, 경우 수정코드 적용바랍니다.<br/>EX) OTC(ETC/P2301), 간식(VF2301)<br/>* 문의사항 : 02)570-3844(홍보팀)</div> |                                                                                                 |                                                                                   |                                          |
|                                                                                                        |                                                                                                 |  | <div>일양약품</div> <div>제약회사 (주) 일양약품</div> |

디자인사양은 반드시 좌측상단에 배치바랍니다.

1P



2P

**[사용상의 주의사항]** 1. 다음 환자에는 투여하지 말 것. 1) 투석요법을 받고 있는 환자 2) 이 약은 유당(젓당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp유당(젓당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다. 2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것. 1) 이 약으로 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움증)을 일으킨 일이 있는 환자 2) 다른 약물을 투여 받고 있는 환자 3) 신장에 환자 4) 간장에 환자 5) 의사의 치료를 받고 있는 환자 6) 인산염 저하가 있는 환자 3. 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 약사와 상의할 것. 1) 월임이 높은 환자 또는 고령자 2) 심장 또는 신장에 장애가 있는 환자 3) 부종(부기)이 있는 환자 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자 4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 1) 본제의 복용에 의해 노란이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나거나 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담할 것. 2) 위알도스테론증 : 1일 최대 복용량이 감소해서 1g

이상인 제제는 장기연용(계속 복용)할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임), 부종(부기), 체중 증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지할 것. 3) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지할 것. 5. 복용 중 또는 복용 후는 다음 사항을 주의할 것. 칼륨 함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크리산) 또는 치아지드계 이뇨제(트리클로르메치아지드)와 병용(함께 복용)시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여할 것. 6. 부작용 1) 이 약을 투여함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움 등)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다. 2) 이 약을 투여함으로써 드물게 동맥, 출음, 현훈(어지러움), 권태감, 두통이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 의사와 상의한다. 3) 이 약을 투여하는 동안 드물게 변비, 또는

입이 마르는 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다. 4) 순환기계 : 드물게 심계항진(두근거림)이 나타날 수 있다. 5) 간장 : 드물게 GOT, GPT 상승이 나타날 수 있다. 7. 일반적 주의 1) 정해진 용법, 용량을 잘 지키다. 2) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다. 3) 장기연용(계속 복용)을 하지 않는다. 4) 신장병의 병력이 있는 환자는 복용전에 의사 또는 약사와 상의한다. 8. 상호작용 위장진통, 진경제와 병용 투여(함께 복용)하지 않는다. 9. 소아, 임부에 대한 투여 1) 이 약은 소아(15세 미만)에게는 투여하지 않는다. 2) 임신부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유 중인 부인에게는 투여하지 않는다. 10. 저장상의 주의 사항 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다. 2) 직사 일광을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다. 3) 오염(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

최종 개정연월일 : 2024.03.13