

브이콤정 -300정-

■ 원료약품 및 분량 1정 중

- 유효성분: 피리독신염산염(KP)-15mg, 리보플라빈(KP)-15mg
- 첨가제(타르색소): 황색203호, 적색40호
- 기타 첨가제: 카르복시메틸셀룰로오스나트륨, 알긴산, 스테아르산마그네슘, 포비돈, 침강탄산칼슘, 콜로이드성이산화규소, 미결정셀룰로오스, 라우릴황산나트륨, 탭실드분홍색(99P650), 시트르산수화물

■ 성상: 분홍색의 장방형 필름코팅정

■ 효능·효과: 다음 경우의 비타민(B2, B6)의 보급

- 육체피로, - 임신·수유기, - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하시
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다. · 다음 증상의 완화: 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

■ 용법·용량: 8세 이상: 1일3회 2정 복용한다.

- ## ■ 사용상의주의사항
1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. (1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것 (1) 레보도파
 3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. (1) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(meuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. (2) 우발적으로 과량복용한 경우 (3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

일반의약품

분류번호: 03990

V-com Tab

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 (1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. (2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것 (3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다. 6. 저장상의 주의사항 (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것. (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

TOT331101-00

조제용

■ 저장방법: 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관 ■ 사용기간: 제조일로부터 36개월

■ 포장단위: 300 정/병 ■ 제조자: (주)넥스팜코리아 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 168-41

■ 제조의뢰자: (주)오스코리아 제약 강원특별자치도 원주시 문막읍 문막공단길 252

※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여 주시기 바랍니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하세요.

※ 의약품 사용 후 부작용 발생시, 부작용 신고 및 피해구제 신청은 한국의약품안전관리원에 할 수 있습니다. 신청방법: 1644-6223, 14-3330 | karp.drugsafe.or.kr 소비자상담번호: 02-477-7301

본 의약품은 우수약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 품질검사를 필한 제품입니다. 만약, 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

제조번호:

사용기한: