

일반의약품 정보

이 약을 사용하기 전 반드시 아래의 기재사항을 확인하세요.

[유효성분] 1정 중 트리메부틴말레산염(KP)..... 200mg

[효능·효과] 1. 주효능 효과 1) 식도역류 및 열공(구멍)헤르니아 (탈장), 위·십이지장염, 위·십이지장 궤양에 있어서의 소화기능이상 (복통(배아픔), 소화불량, 구역, 구토) 2) 과민성 대장 증후군 및 경련성 결장 3) 소아 질환: 습관성 구토, 비감염성 장관통과장애(변비, 설사)

[용법·용량] 성인: 트리메부틴말레산염으로서 1회 100~200mg 1일 3회 식전에 경구 투여한다(먹는다). 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것. 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로 갈락토오스 불내성(Galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

2. 부작용 1) 소화기계: 드물게 변비, 설사, 복명(창자 가스소리), 구역, 구토, 소화장애, 구갈(목마름), 구내(입안) 마비감 등이 나타날 수 있다. 2) 순환기계: 드물게 심계항진(두근거림)이 나타날 수 있다. 3) 정신신경계: 드물게 피로감, 졸음, 현기(어지러움), 권태감, 두통 등이 나타날 수 있다. 4) 간장: 드물게 GOT, GPT 상승이 나타날 수 있다. 5) 과민증: 드물게 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.

※ 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>) 의약품 등 검색을 참조하시기 바랍니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청: 한국약품안전관리원(1644-6223)

※ 올바른 사용법을 모르시거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사 및 자사 소비상담실로 문의

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회고시 "소비자분쟁해결기준"에 의거 구입한 곳에서 교환 또는 환불 받을 수 있음

3. 임부에 대한 투여 임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌)한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

4. 수유부에 대한 투여 수유중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 수유중인 부인에는 투여를 피하고 부득이 투여시는 수유를 중지한다.

5. 다음 환자에는 신중히 투여할것.

이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

[첨가제] ▪ 첨가제(동물유래): 유당수화물(기원동물: 소, 사용부위: 우유) ▪ 첨가제: 경질무수구산, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 크로스포비돈, 황색4호, 히드록시프로필셀룰로오스

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 10정/상자((10정/PTP X 1))

[사용기한] 용기 측면에 표기

〈작성연월일: 2024. 03. 12〉