

 동아제약		디자인 담당자	
		이한빈	
제품명	마그라비 피돌렉스 10C 인서트	소재명	인서트
출고날짜	2025. 02. 07.	규격	110 * 180 mm
인쇄도수	1도 PANTONE 2747 C		
후가공		재질	모조지
확인 사항	항목		체크
비고	전문 7pt 이상, 줄간격 0.5pt 이상		

앞

110*180mm



음수율이 다른 피돌산 마그네슘 복합제

마그라비
피돌렉스
연질캡슐

일반의약품

[제품명] 마그라비피돌렉스연질캡슐

[유효성분] 1캡슐(1,680mg) 중

피돌산마그네슘(EP).....50.00mg
(활성물질용량: 마그네슘으로서 4.33mg)
아스파르트산마그네슘수화물(KP).....50.00mg
(활성물질용량: 마그네슘으로서 3.74mg)
산화마그네슘(KP).....250.00mg
(활성물질용량: 마그네슘으로서 150.78mg)
토코페롤아세테이트(KP).....200.00mg
(활성물질용량: 비타민E로서 200IU)
벤포티아민(KP).....60.00mg
(활성물질용량: 티아민염산염으로서 43.38mg)
피리독신염산염(KP).....50.00mg
리보플라빈(KP).....50.00mg
니코틴아미드(KP).....10.00mg
감마-오리자놀(KP).....5.00mg
시아노코발라민(KP).....0.50mg

[첨가제(동물유래성분)] 숙산산젤라틴 (기원동물: 돼지, 사용부위: 가죽)

[기타 첨가제] 농글리세린, 락색소, 레시틴, 산화티탄, 아자경화유, 공기름, 홍화황색소, 황납

[성상] 주황색의 유사 내용물을 함유한 진한 다홍색의 불투명한 장방형 연질캡슐

[효능·효과]

■ 다음 경우의 비타민 E, B₁, B₂, B₆의 보급
- 육체피로 - 임신·수유기 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하 시 - 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
· 비타민E(“토코페롤아세테이트”) : 말초혈행장애 및 갱년기 시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)
· 비타민B₁(“벤포티아민”) : · 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등) · 각기 · 눈의 피로
· 비타민B₂(“리보플라빈”), 비타민B₆(“피리독신염산염”) : · 다음 증상의 완화 : 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
■ 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

[용법·용량] 만 12세 이상 및 성인 : 1일 2회, 1회 1캡슐 또는 1일 1회, 1회 2캡슐 복용

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
2) 만 12개월 미만의 젖먹이
3) 심한 증상의 신부전 환자
4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것

1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
3) 심장·순환기계기능 장애 환자
4) 신장장애 환자
5) 저단백혈증 환자

뒤

110*180mm



6) 임부

7) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우

위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토, 묽은 변, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하

2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.

3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.

4) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g 의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy) : 말초 신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.

5) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.

6) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.

7) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.

8) 항알도스테로네, 트리암테레나 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것

9) 우발적으로 과량복용한 경우

10) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것

2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.

3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것

4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체내배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 존재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 10캡슐/PTP

[문의전화] 080-920-2002(고객만족팀)

[부작용 보고 및 피해구제 신청] 1644-6223(한국의약품안전관리원), 14-3330(피해구제 신청 전용번호)

[최신정보 확인방법]

이 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.dapharm.com)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 이 약을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.

※ 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

[작성일자] 2025.02.04

[제조(외주) 동아제약(주)]

본사 : 서울특별시 동대문구 전호대로64

공장 : 충청남도 천안시 서북구 백석공단1로 200-23 (1, 2A, 4A층)

[제조자] (주)알피바이오

경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7



MGRX10-25A001