

건위소화제

위라인^정

대한뉴팜

【원료약품 및 분량】 1정 중

- 유효성분 : 판크레아틴(KP) 175 mg, 셀룰라제(KP) 50 mg,
우르소데옥시콜산(KP) 10 mg, 시메티콘(KP) 25 mg
- 첨가제(동물유래성분) : 유당(젖당)수화물(소, 우유)
- 첨가제(타르색소) : 황색203호, 청색1호
- 기타첨가제 : 스테아르산마그네슘, 이산화규소, 미결정셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 크로스카멜로오스나트륨, 히드록시프로필셀룰로오스, 폴리에틸렌글리콜 6000, 히프로멜로오스, 탭실드녹색39G1527

【성상】 연녹색의 타원형 장용성 필름코팅정

【효능·효과】 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체함, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

【용법·용량】 만 15세 이상 : 1회 2정, 1일 3회 식후에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 만 7세 이하의 어린이
 - 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactosemalabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
 - 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
 - 3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

【제조의뢰자】 대한뉴팜(주) / 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 66

【제조사】 (주)노바엠헬스케어 / 경상북도 경산시 하양읍 지식산업4로 16-53

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 유효기한 또는 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국, 병원, 도매상을 통하여 교환하여 드립니다. 기타 자세한 문의 사항은 당사 개발팀으로 문의하여 주시기 바랍니다.(전화 : 031-778-2600).

※ 의약품 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원에 피해구제를 신청할 수 있습니다.

제품 개봉 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

【제조번호】

【사용기한】

