

진코신[®]정 240mg
(은행엽건조엑스)

Ginkocin[®] Tab. 240mg
(Ginkgo Biloba Leaf Dried Extract)

일반의약품

【원료약품 및 그 분량】 1정 중:

- 효효성분: 은행견조엑스(생귀)..... 240.00mg
- 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(기원동물: 소, 사육부위: 우유)
- 기타첨가제: D-만니톨, 결정무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 크로스카멜로오스나트륨, 텔크, 텔셀드녹색(99G1033)

【성 상】

녹색의 장방형 필름코팅정제

【효능·효과】

집중력 저하, 기억력 감퇴, 현기증 (동맥경화 증상)과 같은 증상이 동반되는 정신 기능 저하

【용법 · 용량】

은행엽건조엑스로서 1회 240 mg, 1일 1회 1정 복용한다. 식사와 관계없이 복용할 수 있다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것
 - 1) 은행병진조역소 또는 이 약의 다른 성분에 대한 과민증이 있는 환자
 - 2) 어린이와 청소년에서 이 약의 복용(사용)에 대한 연구가 충분하지 않다. 따라서 이 약은 18세 미만의 어린이와 청소년에게 사용해서는 안 된다.
 - 3) 임신부
 - 4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 이 약을 복용(사용)하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것
 - 1) 항응고제(예: 펜토프론, 와파린, 클로피도그렐, 아세틸 살리실산 및 기타 비스테로이드성 항염증제)를 병용투여(함께 복용(사용))하는 경우, 이들의 약효가 강화되는 것을 배제할 수 없다.
 - 2) 다른 의약품과 마찬가지로 이 약도 시토크롬 P450, 3A4, 1A2, 2E1, 2C9를 통해 다양한 다른 의약품의 대사에 영향을 미치는 것을 배제할 수 없으며, 이는 약효/또는 효력 지속 시간을 변화시킬 수 있다. 이 약을 니페디핀 및 딜티아제과 같은 칼슘제거차단제와 병용투여(함께 복용(사용))할 경우 생체이용률에 영향을 미침으로써 이들 물질의 혈중 수준이 낮아질 위험이 있다. 경구용 테오필린과 병용투여(함께 복용(사용))할 경우 배설에 영향을 미침으로써 이들 물질 수준이 낮아질 위험이 있다. 따라서 주의깊게 모니터링하고 용량을 조정해야 한다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것
 - 1) 출혈 장애가 있거나 출혈의 위험을 증가시키는 약물을 복용(사용)하고 있는 환자는 의학적 조언을 구해야 한다.
 - 2) 수유부(모유) 이행여부가 알려지지 않음
 - 3) 이 약을 복용(사용)하여 뇌전증 환자의 추가 발작이 촉진되는 것을 배제할 수 없다.
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사,

치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를
소지할 것.

- 1) 약을 복용(사용)하면 출혈 위험이 증가할 가능성이 있으므로 안전을 위해 수술 전 최소 36시간 전에 이 약의 복용(사용)을 중단해야 한다.
 - 2) 복용기간은 증상의 정도에 따라야 하며 최소 8주 이상 지속되어야 한다. 3개월 뒤 증상이 호전(나아짐)되지 않거나 증상이 악화되면 의사에게 복용(사용)을 지속해도 되는지 확인해야 한다.
 - 3) 이상반응
 - 위장 장애 : 오심(구역) 등의 위장관 증상,
 - 신장 장애 : 매우 드물게 두통, 불면증, 불안, 혼란,
 - 피부 : 매우 드물게 알레르기 반응(예: 피부 홍반(붉은 반점), 부어오름, 가려움증), 알레르기성 쇼크가 있을 수 있다.
 - 4) 장기 사용의 경우 출혈이 일어난 사례가 보고되었다.
 - 5) 국가 자발적 이상사례 보고자 (1989-2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
 - 어지러움
 - 가려움증
 - 5) 아나필락시스 또는 아나필락시스 반응 보고가 있다. 다만, 이로써 해당성분과 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
- 기타 약의 복용(사용)시 주의할 사항
- 이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에게는 투여하지 않는다.
- 지정상의 주의사항
- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】

기밀용기, 상온(15~25°C)보관

【포장단위】

30정/병, 300정/병

【제조의뢰 및 판매자】

제일약품(주)
경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 7 (B동 외)

【전공정위탁제조자】

코스맥스파마(주)
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 168-23

【일부공정위탁제조자】

코스맥스파마(주)
충청북도 제천시 바이오밸리3로 30 일부

구미시 사용기준에 경과하였으나 변별 또는 오손된 제품은 약품
병원, 의원, 도매상
개설자에 한하여 교환하도
리니 이의와
은 제품은 구입 유통
경로를 통해서만 반송하
여 주시기를 바랍니다.
소지자 문의는 본시
마케팅부(수신자부담:080-555-7171)에
상
답해 드립니다. 제조과정과 관련된 제품의 품질에 대한 문의사항은
책임자 겸 품질경영본부(전화: 080-333-6312)로 연락바랍니다.
매출 사용 후 부속품(인상반)이 발생한 경우 한우국립유전관리
관리(1644-6223) 혹은 의약품 폐허구제 전용 상담번호(14-
3330)에 문의하여 부속품 의약품 폐허구제 신청을 할 수 있습니다.

설명서작성년월일 : 2024. 02. 28
1FX-B-0000-A2-01

“설명서 작성년월일 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지 (www.jeilpharm.co.kr) 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템 (<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.”



제 일 약 품