

제뉴원니세르골린정
30밀리그램 니세르골린

25×25mm

전문 의약품

제뉴원니세르골린정
30밀리그램
니세르골린



[원료약품 및 분량] 이 약 1정 중

·유효성분: 니세르골린(EP) 30.0 mg
·기타 첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이 노란색(03A620045), 인산수소칼슘수화물, 저치환도 히드록시프로필셀룰로오스(LH-22), 크로스카멜로오스나트륨

[성상] 황색의 원형 필름코팅정

[효능·효과]

일자성 퇴행성 혈관치매 및 복합성치매와 관련된 다음 치매 증후군의 일차적 치료 : 기억력 손상, 집중력장애, 판단력 장애, 적극성 부족

[용법·용량]

성인 : 니세르골린으로서 1일 1회 30 mg을 식전에 경구투여한다. 이 용량에서 원하는 효과가 나타나지 않을 경우 60 mg까지 증량할 수 있다. 증상이 호전 된 후 감량이 가능하다. 신장기능에 이상이 있는 환자의 경우 (혈청 creatinine >175 μmol/L) (2 mg/dL)는 감량하여 투여한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약 또는 맥각알칼로이드에 과민반응 환자
- 2) 급성 심근경색 환자
- 3) 급성 출혈 환자
- 4) 고감신경효능약을 투여받고 있는 환자
- 5) 현저한 서맥 환자(< 50 회/분)
- 6) 두개내출혈 후 지혈이 끝나지 않은 환자
- 7) 기립수절장애 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 경증의 서맥 환자
- 2) 신기능장애 환자

3. 이상반응

- 1) 소화기계 : 드물게 식욕부진, 설사, 변비, 구역, 구토, 상재성 상부복통 또는 경련, 구갈 등이 나타날 수 있다.
- 2) 간장 : 드물게 ALT, AST 상승 등이 나타날 수 있다.
- 3) 순환기계 : 드물게 어지럼, 기립수절장애, 고혈압, 혈중 요산의 상승, 혈압강하 등이 나타날 수 있다.
- 4) 정신신경계 : 드물게 졸음, 권태감, 두통, 이명, 피로, 불면 등이 나타날 수 있다.
- 5) 과민반응 : 드물게 발진, 두드러기, 가려움, 홍조, 열감 등이 나타날 수 있다.
- 6) 시판후 4년 동안 국내에서 811명의 환자를 대상으로 이 약의 재심사를 위한 사용성적조사를 실시한 결과, 발현된

이상반응은 22명에서 30건(3.70 %)이며, 시판후 새로이 나타난 이상반응 중 이 약과 인과관계가 있을 수 있는 것으로는 약용, 기분이상, 소화불량(각 1건)이 있다.

4. 일반적 주의

- 1) 이 약과 다른 혈압강화제를 병용하는 경우에는 혈압 강화작용을 증가시킬 수 있으므로 혈압을 자주 확인한다.
- 2) 요산의 대사와 배설에 영향을 미칠 수 있으므로 고요산 혈증환자 또는 과거 통풍의 병력이 있는 환자는 주의하여 투여한다.
- 3) 이 약을 복용한 후 운전이나 기계조작을 주의하여야 한다.

5. 상호작용

- 1) 이 약은 혈압강화제의 효과를 상승시킬 수 있다.
- 2) 이 약은 CYP450 2D6를 통해 대사되므로 동일한 대사 경로를 갖는 약물과 상호작용이 나타날 수 있다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 동물실험에서 고용량 투여시 배자독성 기형을 유발한 보고가 있다.
- 2) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확인되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- 3) 동물실험에서 유증으로의 분비가 보고되었으므로 수유중에는 투여를 피하고 부득이한 경우에는 수유를 중단한다.

7. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

8. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성은 확인되어 있지 않다.

9. 과량투여시의 처치

과량투여시 일시적으로 혈압이 낮아질 수 있다. 필요한 경우 혈압변화를 측정하는 등 필요한 조치를 한다.

10. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

11. 의약품동등성시험 정보 주1)

시험약 경동니세르골린정30밀리그램(니세르골린)[경동제약(주)]과 대조약 사미온정30밀리그램(니세르골린)[일동제약(주)]을 2x2교차시험으로 각각 1정씩 건강한 성인에게 공복 시 단회 경구투여하여 36명의 혈중 니세르골린 대사체(MDL)을 측정 한 결과, 비교평가항목치(AUC_t, C_{max})를 로그변환하여 통계 처리하였을 때, 평균치 차의 90% 신뢰구간이 log 0.8에서 log1.25이내로서 생물학적으로 동등함을 입증하였다.

구분	비교평가항목		참고평가항목		
	AUC _{0-36hr} (ng·hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)	
대조약	사미온정30밀리그램 (니세르골린) [일동제약(주)]	536.2 ±88.26	55.78 ±14.46	2.67 (2.00~6.00)	10.81 ±1.53
시험약	경동니세르골린정 30밀리그램(니세르골린) [경동제약(주)]	539.9 ±82.02	56.51 ±11.74	2.67 (2.00~6.00)	10.64 ±1.09
90% 신뢰 구간* (기준:log0.8 ~ log1.25)		log0.9878 ~ 1.0299	log9690 ~ 1.0846	-	-

(AUC_t, C_{max}, t_{1/2}; 평균값±표준편차, T_{max}; 중앙값(범위), n=36)

AUC_t: 투약시간부터 최종혈중농도 정량시간 t까지의 혈중농도-시간곡선하면적
C_{max}: 최고혈중농도
T_{max}: 최고혈중농도 도달시간
t_{1/2}: 말단 소실 반감기

* 비교평가항목치를 로그변환한 평균치 차의 90% 신뢰구간

주1) 이 약은 경동제약(주) 경동니세르골린정30밀리그램(니세르골린)과 동일한 처방 및 동일한 제조방법으로 전 공정을 (주)유엔생명과학에 위탁 제조하였음.

[저장방법] 차광밀폐용기, 실온보관(1~30°C)

[포장단위] 100정/병

[제품문의] 080-601-0080

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 통한 제품이며, 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
※ 의약품을 복용(사용)하기 전에 사용자께서는 설명서를 주의 깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.
※ 의약품은 어린이의 손에 닿지 않도록 보관하시기 바랍니다.
※ 유효기간 또는 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.
※ 이 설명서 최종 개정연월일(2024.03.04) 이후 변경된 내용은 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 통해 확인하실 수 있습니다.
※ 의약품 부작용 보고 및 피해구제 신청: 한국 의약품안전관리원(1644-6223 또는 14-3330)

[제조외곽지]

주식회사제뉴원사이언스

세종특별자치시 전의면 산단길 245

[제조자]

(주)유엔생명과학

경기도 안산시 단원구 별당로 627