

일반의약품 정보

이 약을 사용(복용)하기 전에 반드시 본 기재사항을 확인하세요.

[유효성분] 1정 중

브로멜라인(KP)(20,000 브로멜라인 단위)..... 40.0mg
결정트립신(USP)1.0mg
(2,500 USP 트립신단위), (동물유래 : 소, 사용부위 : 췌장(이자))

[효능·효과]

다음 질환 및 증상의 염증성 부종(부기)의 완화 : 수술 및 외상(상처) 후, 유즙울체(젖고임)

[용법·용량]

성인 : 첫날 1회 2정, 1일 4회, 이후 유지량으로 1회 1정, 1일 4회 복용한다.
체내에서의 작용기전은 아직 해명되지 않은 점이 많고 용량, 효과관계도 밝혀진 것이 아니므로 목적 없이 투여하지 않는다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 1) 혈액응고이상 환자 2) 심한 간장애 또는 신장애(신장(콩팥)장애) 환자 3) 임부 및

임신하고 있을 가능성이 있는 여성(임신중 투여에 관한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 치료상의 유익성이 위험성을 상회(우뚹)한다고 판단되는 경우에만 투여한다.) 4) 항응고제를 투여하고 있는 환자(병용(함께 복용(사용))투여에 의해, 항응고제의작용이 증강될 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 신중히 투여한다.)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 과민반응 : 발진, 발적(충혈되어 붉어짐) 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 2) 소화기계 : 설사, 변비, 때때로 식욕부진, 배가 거북함, 구역, 구토 등의 증상이 나타날 수 있다. 3) 혈액계 : 드물게 코피, 혈액가래 등의 출혈경향이 나타날 수 있다.

4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

5. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관할 것. 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아보관할 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

[사용기한] 케이스 측면 표시일까지

[첨가제]

- 첨가제(타르색소) : 황색203호, 청색1호
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유)
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 콜로이드성이산화규소, 크로스포비돈, 스테아르산마그네슘, 탭실드흰색(11W401), 탭실드녹색(319G726)