제품명 : 파워쎈연질캡슐
자재명 : 호일
Size : 50*65mm
Version : Rev.1
작성일 :
색상 : 금색 호일 🟨
Pantone 188C 🟥
Pantone 185C 🟥

50mm

일반의약품 1캡슐

육체피로 · 체력저하

파워쎈에이 연질캡슐

【원료약품 및 분량】 1캡슐 중
- **유효성분 :** 니코틴산아미드(KP) ··· 20mg, 리보플라빈(KP) ··· 3mg, 아스코르브산(USP) ··· 60mg, 티아민질산염(KP) ··· 2mg, 레티놀팔미테이트유(KP) ··· 5mg(비타민A로서 5000 I.U), 토코페롤아세테이트(KP) ··· 10mg(비타민E로서 10 I.U), 피리독신염산염(KP) ··· 3mg
- **첨가제(동물유래) :** 숙신산젤라틴(소, 가죽내피) · **첨가제(기타) :** 농글리세린, 레시틴, 백납, 소르비톨액(비결정성), 에틸바닐린, 적색산화철, 팜유, 콩기름



【성 상】 황갈색의 유상물질이 든 암적색의 장방형 연질캡슐
【효능 · 효과】 **다음 경우의 비타민 A, E, B1, B2, B6, C의 보급** : 육체피로, 임신 · 수유기, 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시, 노년기, 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다. – 눈의 건조감의 완화, – 야맹증(밤에 잘 못보는 증상)
【용법 · 용량】 만 8세 이상 및 성인 : 1회 1캡슐, 1일 1회 복용한다.
【저장방법】 차광밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관
【사용기한】 호일 하단 참조
【제조자】 ㈜서흥 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61

제조번호 :

사용기한 :

8806796015219

【사용상의 주의사항】

1. **경고 :** 임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 말 것(비타민 A결핍증 환자는 제외).

2. **다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.** (1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 (2) 만 3개월 미만의 젖먹이 (3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자 (4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자 3. **이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.** (1) 레보도파 4. **다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.** (1) 만 1세 미만의 젖먹이 (2) 의사의 치료를 받고 있는 환자 (3) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태) (4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 ① 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경릉 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생) 증가가 추정된다는 역학조사 결과가 있으므로 임신 3개월이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않습니다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 합니다. (5) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자 (6) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자 5. **다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 이 첨부문서를 소지하십시오.** (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종(부기), 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 묽은 변 (2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다. (3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다. (4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수있습니다. (5) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다. (6) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다. (7) 장기간 고용량의 비타민 A(베타카로틴으로부터 전환된 것을 제외한) 섭취는 폐경기를 지난 여성의 골다공증(뼈엉성증) 위험을 높일 수 있습니다. (8) 우발적으로 과량복용 한 경우 (9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우 6. **기타 이 약의 복용 시 주의사항** (1) 정해진 용법 · 용량을 지키십시오. (2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여하십시오. (3) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 합니다. (4) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다. (5) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다. (6) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다. 7. **저장상의 주의사항** (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오. (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.