

일반의약품			
이 약을 사용하기 전 반드시 포장의 기재사항을 확인하십시오.			
[유효성분] ■ 간유(EP) 500mg (비타민A(으)로서 500I.U) ■ 콘드로이틴설페이트나트륨(KP) 25mg ■ 토크페롤아세테이트(KP) 25mg (비타민E(으)로서 25I.U) ■ 티아민질산염(KP) 10mg ■ 리보플라빈(KP) 5mg			
[성상] 주황색의 내용물을 함유한 암녹색의 타원형 연질캡슐			
[효능·효과] ○ 다음경우의 비타민 A, E, B ₁ , B ₂ 의 보급 － 육체피로　－ 임신·수유기　－ 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시　－ 노년기 － 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다. ・ 눈의 건조감의 완화　・ 야맹증(밤에 잘 못보는 증상) ・ 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움) ・ 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염 ・ 각기　・ 눈의피로			
[용법·용량]			
만 8세 이상 및 성인		1일 2회, 1회 2캡슐 복용합니다.	
[사용상의 주의사항]			
1. 경고 (1) 임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 마십시오(비타민 A결핍증 환자는 제외).			
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오. (1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 (2) 만 3개월 미만의 젖먹이 (3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자 (4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자 3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.			
		(1) 만 1세 미만의 젖먹이 (2) 의사의 치료를 받고 있는 환자 (3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 ① 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생) 증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A 결핍 증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않습니다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 합니다. (4) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자 (5) 이 약은 황색 5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF) 및 황색203호(퀴놀린옐로우 WS, Quindoline Yellow WS)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다. 4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오. (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종(부기), 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 묽은 변, 식욕부진, 홍반(붉은 반점), 두드러기, 습진, 반구진성 발진, 부종(부기), 부종(부기)·수분저류(고임, 쌓임)(신부전 또는 심부전 환자) (2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다. (3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다. (4) 장기간 고용량의 비타민 A(베타카로틴으로부터 전환된 것을 제외한) 섭취는 폐경기를 지난 여성의 골다공증(뼈연성증) 위험을 높일 수 있습니다. (5) 우발적으로 과량복용 한 경우 (6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우 5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 (1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오. (2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여하십시오. (3) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 합니다. (4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다. (5) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다. 6. 저장상의 주의사항 (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오. (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.	
[저장방법]		■ 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 ■ 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.	
[사용기한]		■ 용기 측면 표기일까지	
[첨가제]		■ 첨가제(타르색소) : 황색5호, 황색203호, 청색1호 ■ 첨가제(동물유래) : 백납(기원동물 : 꿀벌, 사용부위 : 꿀벌집), 젤라틴(기원동물 : 소, 사용부위 : 가죽) ■ 기타 첨가제 : 콩기름, 아자경화유, 레시틴, 소르비톨 액(비결정성), 농글리세린, 산화티탄, 정제수	