

프로젝트 시방서

자재명	차엠지연질캡슐
규격(장폭고/두께)(mm)	100x200mm
인쇄도수	먹1도
용지/코팅/후가공	모조지70g / 양면인쇄

CMG제약

CMG제약

일반의약품

마그네슘, 비타민, 감마오리자놀 함유한
근육경련 / 피로 / 말초혈행 장애 개선제

차엠지
CHAMg soft cap.

[원료약품 및 분량] 1캡슐 중
· 유효성분: 토코페롤아세테이트(KP) 300mg
(비타민E)로서 300IU)
산화마그네슘(KP) 400mg
(마그네슘)로서 241.25mg)
피리독신염산염(KP) 50mg
벤포티아민(KP) 60mg
(티아민염산염)로서 43.38mg)
리보플라빈(KP) 50mg
감마-오리자놀(KP) 5mg
시아노코발라민(KP) 500µg
· 첨가제(타르색소) : 적색40호, 적색3호, 청색1호
· 첨가제(동물유래성분) : 백납(기원동물 : 꿀벌, 사용부위 : 꿀벌집),
숙신산젤라틴(기원동물 : 돼지, 사용부위 : 가죽)
· 기타 첨가제 : 공기름, 레시틴, 폴리소르베이트80, 농글리세린, 산화티탄, 정제수
[성상] 미황색 내지 황색의 유상 내용물을 함유한 암적갈색의 장방형 연질캡슐
[효능 · 효과]
○ 다음 경우의 비타민 E, B1, B2, B6의 보급
－ 육체피로
－ 임신 · 수유기
－ 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
－ 노년기
－ 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같습니다.
· 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨 · 목결림, 수족저림 · 수족냉증(손발이 차가움)
· 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염),
구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
· 각기
· 눈의피로
○ 마그네슘결핍으로 인한 근육경련
[용법 · 용량]
만 12세 이상 어린이 및 성인 : 1일 2회, 1회 1캡슐 복용합니다.
[사용상의 주의사항]
1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
(1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
(2) 만 12개월 미만의 젖먹이
(3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
(4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
(1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
(2) 레보도파
3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
(1) 만 1세 미만의 젖먹이
(2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
(3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
(4) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
(5) 신장장애 환자
(6) 저단백혈증 환자
(7) 임부
(8) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를
신중히 투여해야 하는 환자
(9) 이 약은 적색40호를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는
신중히 투여합니다.
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시
가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
(1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어

붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하
(2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
(3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
(4) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상 (neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
(5) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
(6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 유헤림부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
(7) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
(8) 우발적으로 과량복용 한 경우
(9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
(1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
(2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여하십시오.
(3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
(4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.
(5) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자가 다른 경주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.
6. 저장상의 주의사항
(1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
(2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관하십시오.
(3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.
[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C)보관
[포장단위] 60 캡슐/상자(10캡슐/피티파*6), 120 캡슐/상자(10캡슐/피티파*6*2))

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과하였거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, “소비자 피해 보상규정” 에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.
※ 의약품 부작용 피해구제신청은 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 할 수 있습니다.
※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.
※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.
※ 작성일자 이후 변경된 내용은 의약품안전나라(nedrug.mfds.go.kr) 또는 031)314-0329 (소비자상담실)에서 확인할 수 있습니다.

문안작성일 : 2024. 06. 05 (Rev.0)

[제조외 및 판매자] (주)씨엠지제약 / 경기도 시흥시 공단1대로27번길 27

[제조사] **동방에프티엘(주)** / 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 78