

렛잇비 프로

PRO

비타민·미네랄 함유한 고함량 멀티비타민 렛잇비프로원정

렛잇비프로원정은 활성형 비타민 B 3종을 함유하고 있을 뿐만 아니라 현대인들이 결핍되기 쉬운 항산화 성분(셀레늄, 비타민 E) 및 UDCA, 마그네슘, 아연 등 영양소를 포함하고 있어 피로회복 및 영양소 보충에 효과적인 고함량 멀티비타민입니다.

특 장 점

1. 활성형 비타민 B 3종 함유
2. 항산화 성분(셀레늄, 비타민 E) 및 UDCA, 마그네슘, 아연 등 영양소 함유
3. 비타민 D 1일 1,000IU 함유

효능·효과



육체피로
몸이 나른하고
자도 피로하신 분



근육통,관절통
근육이 자주 뭉치고
걸리시는 분



빠·이의 발육불량
비타민 부족으로 인해 빠나 치아의
회복, 성장이 더딘 분



눈의피로
컴퓨터에 스마트폰까지
눈이 침침하고 피로하신 분

【원료약품 및 그 분량】 - 1정 중 -

【유효성분】

벤포타이민(비타민B ₁)(KP)	100mg	D-비오틴(USP)	0.1mg	토코페롤아세테이트 50%(EP)	40mg
(타이민염산염)(으로서 72.31mg)		폴산(엽산)(KP)	0.1mg	(비타민D ₃)으로서 20IU)	
리보플라빈부타레이트(비타민B ₂)(KP)	12mg	신화아연(KP)	20mg	셀레늄함유간조효모(KP)	76.39mg
니코틴아미드(비타민B ₃)(KP)	10mg	(아연)(으로서16mg)		(셀레늄)(으로서 41.25μg)	
판토텐산칼슘(비타민B ₅)(KP)	50mg	녹충콜레칼 시메콜(비타민D ₃)(EP)	10mg	우르소데옥시콜산(UDCA)(JP)	10mg
피리독살포스페이트수화물(비타민B ₆)(KP) ...	5mg	(비타민D ₃)으로서 1,000IU)		산화마그네슘(USP)	30mg
시아노코발라민(으로서 50μg)				(마그네슘)(으로서 18mg)	

【첨가제】 동물유래성분

유당수화물, 우유, 기타첨가제:
경질우유구산, 구화미결정셀룰로오스,
미결정셀룰로오스, 바나린미크론,
스테아르산마그네슘,
크로스카멜로오스나트륨, 크로스포부덴,
탐알드르산제(S2Y41), 탐알드클리어
(92C069), 탐알드화제(93W45),
하이드록시프로필셀룰로오스

【효능·효과】

1. 다음 경우의 비타민 D, E, B₁, B₂, B₆ 의 보급
- 육체피로 - 임신·수유기 - 병중·병후(병을 앓은 동안이나 회복 후)의 체력저하시 - 발육기 - 노년기
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
- 빠, 이의 발육불량 - 구루병의 예방 - 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등),
구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염 - 각기 - 눈의피로
3. 아연의 보급

【용법·용량】 만 8세 이상 및 성인: 1일 1회, 1회 1정 복용하십시오.

※ 비타민B군의 함량이 높아 빈 속에 복용 시 일시적으로 속쓰림, 미식거림 등이 있을 수 있으니 식사 후 바로 복용하세요.

【성상】 진한 노란색의 장방형 필름코팅정

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
1) 고칼슘혈증(hypercalcemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육종증(sarcoidosis: 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 3) 만 12개월 미만의 젖먹이 4) 신장결석 환자 5) 심한 증상의 신부전 환자 6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다. 7) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자 8) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
1) 인산염, 칼슘염, 경구약(복용하는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파
3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
1) 만 1세 미만의 젖먹이 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이 4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 ① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다 5) 소화성궤양, 만성궤양상대장염, 국한성(특정 부분)에 나타나는 대장염 등의 위장질환 환자 6) 심장-순환기계기능 장애 환자 7) 신장(콩팥)장애 환자 8) 저단백혈증 환자 9) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자 10) 임부 11) 고지혈증, 당뇨병성고지혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 중단 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 식욕부진, 복부(배)부종(팽만감), 붉은 반점, 부민수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 피부염, 땀, 호흡기 약화, 탈모, 조골증, 위장장애, 소화장애, 상복부(배)부종, 저혈압, 폐부종(부기) 2) 이 약의 투여에 의하여 생기가 예전보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다. 3) 에스트로겐을 포함한 경구약은, 복용하는용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 D를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있다 4) 피라독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. 5) 폴산이 부족한 환자(비타민 B₁₂를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다. 6) 고혈당 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간소상을 일으킬 수 있다. 7) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부정(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. 8) 항알드스테론제, 트리암테넨과 병용함께 복용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것. 9) 우발적으로 과민복합한 경우 10) 개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것 3) 요를 황색으로 변화하여 하역 이상감(가시)에 영향을 줄 수 있다. 4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것. 5) 지방과 부하로 특별한 위험이 예상되는 환자(예)에 이 약을 투여할 때 혈청지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조정한다. 환자가 다른 중추성 지질제를 동시에 투여하고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼합되어있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.
6. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장상의 주의사항】

1. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2. 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
3. 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30°C)보관하십시오. 【포장단위】 60정/병, 120정/상자(60정/병x2), 180정/병

【사용기간】 제조일로부터 24개월입니다.

- ※ 내부 포장에 파손되어 있으면 복용하지 마십시오.
- ※ 본 약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지나거나 변질, 변색, 오염되었거나 손상된 약품은 공정거래위원회 고시(소화)분쟁해결기준에 의거, 구입한 약국 및 약품판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.
- ※ 이 첨부문서 최종 개정 연월일 이후 변경된 내용은 대웅제약 홈페이지(www.daewoong.co.kr) 및 소비자상담 전화번호(080-550-8308-9)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 부작용보고 및 피해구제신청: 한국약품안전관리원(14-3330, 1644-6223)

제조사: (주)대웅제약 / 경기도 화성시 향남읍 제막공단4길 35-14

작성 연월일: 2024.04.08



대웅제약
경기도 화성시 향남읍 제막공단4길 35-14