



【원료약품 및 그 분량】1정 중

유효성분:	
벤포티아민(KP)(티아민염산염으로서 32.54 mg)	45 mg
비스베타타민(KP)(티아민염산염으로서 4.37 mg)	5 mg
리보플라빈부타레이트(KP)(리보플라빈으로서 5.73 mg)	10 mg
제피아스코르브산(별규)아스코르브산으로서 100.01 mg)	103.1 mg
니코틴아미드(KP)	10 mg
판토텐산칼슘(KP)	30 mg
파리독산포스페이트수화물(KP)	10 mg
폴산(KP)	0.25 mg
산화마그네슘(KP)(마그네슘으로서 60.32 mg)	100 mg
메코발라민(KP)	0.5 mg
이노시톨(KP)	10 mg
d-비오틴(USP)	0.05 mg
클레칼시페롤농축분말(EP)(비타민D로서 1,000 IU)(동물유래성분 : 양, 양모)	10 mg
감마-오리자놀(KP)	5 mg
토코페롤아세테이트2배산(KP)(비타민E로서 100 IU)	200 mg
산화아연(KP)(아연으로서 24.10 mg)	30 mg
우르소데옥시콜산(KP)	10 mg
셀레늄함유건조효모(KP)(셀레늄으로서 12.50 µg)	23.15 mg
타우린(KP)	50 mg
침강탄산칼슘(KP)(칼슘으로서 48.05 mg)	120 mg
레티놀아세테이트과립(EP)(비타민A로서 2,000 IU)	4 mg
베타-카로틴20%(별규)(베타카로틴으로서 0.4 mg)	2 mg
유비데카레논(KP)	10 mg
당귀(KP)	10 mg
작약(KP)	10 mg
녹용50%에탄올유동엑스(별규)(동물유래성분 : 숫사슴, 뿔)	5 mg
황기(KP)	5 mg
로얄젤리(생규)(10-히드록시-2-데세노인산으로서 0.6 mg)	15 mg
첨가제 : 경질무수구산, 미결정셀룰로스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이200브라운(200F265005), 전분, 글리콜산나트륨, 크로스카멜로오스나트륨, 폴리에틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스	

【성 상】 진한 갈색의 타원형 필름코팅팅

【효능 · 효과】

1. 다음 경우의 비타민 A, D, E, B1, B2, B6, C의 보급 - 육체피로 - 임신 · 수유기 - 병중 · 병후(병을 앓는 동안 이나 회복 후)의 체력저하 - 발육기 - 노년기 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다. · 눈의 건조감의 완화 · 야맹증(밤에 잘 못보는 증상) · 뼈 · 이의 발육불량 · 구루병의 예방 · 말초혈행장애 및 경련기 시 다음 증상의 완화 : 어깨 · 목결림, 수족저림 · 수족병증(손발이 차가움) · 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등) · 각기 · 눈의피로 2. 아연의 보급

【용법 · 용량】 만 15세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 식후 복용

【사용상의 주의사항】

- 경고 일부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 말 것.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염종질환), 신장(콩팥)질환 환자 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 3) 만 12개월 미만의 젖먹이 4) 신장(콩팥)결석 환자 5) 심한 증상의 신부전 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파
- 다음과 같은 사람(경우는 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태) 3) 일부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 ① 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월 까지 비타민 A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생) 증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A 결핍증치로 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다. ② 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다. 4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성특정 부분에 나타나는 대장염 등의 위장질환 환자 5) 심장 · 순환기계기능 장애 환자 6) 신장(콩팥)장애 환자 7) 저단백혈증 환자 8) 감성배당제를 투여 중인 환자 9) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석에 있는 환자 10) 신장결석 병력이 있는 환자 11) 일부 12) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증, 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성유제를 신중히 투여해야 하는 환자 및 일부, 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 고령자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부 문서를 소지할 것. 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 - 구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통풍성 관절부종(부기), 설사, 위부(상복부)불쾌감, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 붉은 변, 식욕부진, 복부팽만감, 자혈안, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 붉은 반점, 부전수축(신장박동정지), 중추신경계 기능저하, 피부부, 폐부, 호흡기 약력, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부(배부른)통증, 폐부(부기), 복부불쾌감 2) 이 약의 투여에 의하여 생기가 예전보다 활라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다. 3) 에스트로겐을 포함한 경우용 피임제를 복용하는 여성 또는 월전(월경)만월성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있다. 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다. 5) 파라독시스를 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. 6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다. 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia : 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다. 8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. 9) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다. 10) 장기간 고용량의 비타민 A(베타카로틴)로부터 전환된 것을 제외한 섭취는 폐경기를 지난 여성의 골다공증(뼈영양성) 위험을 높일 수 있다. 11) 항알도스테로제, 트리암테네과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것. 12) 우발적으로 과량복용 한 경우 13) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의사항 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것. 2) 복용시 의사, 한의사, 약사, 한약사와 상의 할 것. 3) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 한다. 4) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다. 5) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사지에 영향을 줄 수 있다. 6) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.
- 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 빛을 쬌 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 60정/병, 120정/상자(60정/병×2)

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다.
- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 자세한 사항은 식품의약품안전처 의약품안전나라(<https://fnrdug.mfds.go.kr>)를 참조하십시오.
- 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

첨부문서 작성일: 2024년 04월 01일

【판매원】(주)녹십자 / 충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산단 【제조원】(유)한풍제약/ 전북특별자치도 완주군 봉동읍 2로 586 TEL.080-280-0033 완주산단로 301, 봉동로 705