

리라젠타정 5밀리그램 (리나글립틴베실산염)

리라젠타정 5밀리그램 (리나글립틴베실산염)

※ 의약품들 사용하시기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하십시오.

【조성·성상】
1. 원료약품 및 분량 : 1정 중
· 유효성분 : 리나글립틴베실산염(별규) 6.67mg (리나글립틴(으)로서 5밀리그램)
· 기타첨가제 : D-만니톨, 메글루민, 스테아르산마그네슘, 오파드라임Iamb 188A640008 분홍색, 타르북시메틸셀룰로오스칼슘, 크로스카멜로스나트륨, 포비돈

2. 성상 : 분홍색 원형의 필름코팅정

【효능·효과】
이 약은 제2형 당뇨병 환자의 혈당 조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제로 투여한다.
－ 단독요법
－ 병용요법

【용법·용량】
이 약의 권장 용량은 1일 1회 5mg 이다.
식사후 관개없이 투여할 것.
인슐린 혹은 인슐린 분비촉진제(설폰닐우레아 등)와 병용투여되는 경우 저혈당의 위험을 최소화시키기 위하여 더 낮은 용량의 인슐린 및 인슐린 분비촉진제 투여가 필요할 수도 있다.

【사용상의 주의사항】
1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
1) 이 약의 주성분 또는 다른 성분에 과민증이 있는 환자
2) 제2형 당뇨병 또는 당뇨병성кет산증 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
1) 저혈당을 일으키는 것으로 알려진 약과의 병용투여 하는 환자 : 인슐린 및 설폰닐우레아 계열 등의 인슐린 분비 촉진제는 저혈당을 유발할 수 있다. 이 약을 설폰닐우레아와 병용투여 되었을 때 저혈당의 유발율은 설폰닐우레아와 병용투여 된 위약보다 증가되었다. 중증의 신장에 환자에게 이 약을 인슐린과 병용투여 되었을 때 저혈당의 유발율은 증가되었다. 따라서 이 약과 병용하여 투여시 저혈당의 위험을 최소화하기 위하여 더 낮은 용량의 인슐린 및 인슐린 분비촉진제 투여가 필요할 수도 있다.
2) 심부전 : New York Heart Association (NYHA) functional class I-III의 울혈성 심 부전지 있는 환자에서 투여 경험이 제한적이므로, 이들 환자에서는 신중히 사용해야 한다. NYHA functional class III-IV 환자에서의 임상경험이 없기 때문에 이 약의 사용이 권장되지 않는다.
3) 해당증 : 이 약을 복용하는 환자에서서 급성 해당증이 관찰되었다. 리나글립틴 투여를 중지한 후에는 해당증의 개선이 관찰되었다. 이 약을 복용하는 환자에게 급성 해당증의 특징적인 증상(지속적으로 중증의 복통)에 대해 알려야 하며, 만약 해당증이 의심되면 이 약의 복용을 중단해야 한다.
4) 유사천포창 : 이 약을 복용하는 환자에서 유사천포창이 관찰되었다. 만약 유사 천포창이 의심되면 이 약의 복용을 중단해야 한다.

3. 이상반응
1) 단독 요법 및 병용요법
이 약의 안전성은 제2형 당뇨병 환자 중 이 약 5 mg이 투여된 환자를 통해 평가 되었다. 위약-대조군 시험에서 10,963명의 피험자 중 6,580명의 피험자에 대하여 치료용량인 리나글립틴 5mg이 투여되었다. 위약-대조군 시험에서 발해 분석 한 결과, 위약 투여군과 리나글립틴 5 mg 투여군의 전체적인 이상반응 발현률이 유사하였다 (63.4% 대 59.1%). 이상반응에 의해 치료를 중단한 피험자는 리나글립틴 5 mg투여군(3.4%)에 비해 위약 투여군(4.3%)이 높았다. 가장 흔하게 보고된 이상사건은 저혈당으로 리나글립틴, 메트포르민, 설폰닐우레아의 সঙ্গে 병용 요법 하에서 22.9%, 위약에서 14.8%였다. 위약대조 임상시험에서 저혈당 (10.9%, 471명)은 중증도에 따라 경증(80%, 384명), 중등증(16.6%, 78명) 또는 중증(1.9%, 9명)이었다. 임상시험에서의 단독요법, 초기 병용 요법 또는 추가 병용 요법으로 리나글립틴 5 mg이 투여된 이중노가람시험에서 보고된 이상반응 및 시간 후 경험에서 확인된 이상반응을 아래 표에 정리하였다(표 1). 모든 이상반응은 각 발현부위 별로 발현빈도가 기재되어 있으며 빈도에 대해서는 다음의 정의가 사용되었다: 매우 흔하게(≥ 1/10), 흔하게(≥ 1/100 ~ <1/10), 흔하지 않게(≥ 1/1,000 ~ <1/100), 드물게(≥ 1/10,000 ~ <1/1,000), 매우 드물게(< 1/10,000), 알 수 없음(사용 가능한 자료로부터 추정 불가).

표 1. 리나글립틴을 1일 5 mg씩 임상시험에서 단독 또는 추가 병용 요법으로 투여한 피험자에게 보고된 이상반응 및 시간 후 경험에서 확인된 이상반응

계통분류	이상반응	빈도수
감염 (Infections & infestations)	비인두염	흔하지 않게
면역계 이상	과민반응 혈관부종* 두드러기*	흔하지 않게 드물게 드물게
대사 및 영양 이상	저혈당증(메트포르민 및 설폰닐우레아와 병용투여 시) 고중성지방혈증(설폰닐우레아와 병용투여 시) 고지질혈증(피오글리타존과 병용투여 시)	매우 흔하게 알 수 없음 알 수 없음
호흡기, 흉부 및 종격 이상	기침	흔하지 않게
위장관 이상	해장증 변비(인슐린과 병용투여 시) 구강 궤양*	흔하지 않게 흔하지 않게 드물게
피부 및 피하조직 이상	발진* 유사천포창*4	흔하지 않게 드물게
근골격계 및 결합 조직 이상	중증 및 장மை 동반하는 관절통* 원문근통*	알 수 없음 알 수 없음
조사 (Investigation)	체중증가(피오글리타존과 병용투여 시) 지질분해효소 증가* 아밀라제 증가*	흔하게 흔하게 흔하지 않게

* 시간 후 경험에 근거한 약물이상반응
2 임상시험에서 관찰된 정상 상한치의 3배 초과 증가
3 리나글립틴과 혈당 대조약인 글리메피리드를 비교한 CAROLINA 연구(임상시험정보 참조)에 따르면, 아밀라제와 실험실적 분석에서 리나글립틴 환자군의 0.99%에서, 그리고 글리메피리드 환자군 0.54%에서 정상상한치의 3배 초과 증가를 보였다.

4 리나글립틴 실험관 및 신장 안전성 연구(CARMElina)(임상시험정보참조 참조)를 참조

2) 저혈당
위약대조 임상시험에서 이 약 5 mg을 투여받은 총 4302명 환자 중 저혈당을 보고한 환자는 471명 (10.9%)이었으며, 반면 위약투여군 총 2364명 환자 중 저혈당을 보고한 환자는 275명 (11.6%) 이었다.

3) 실험실적 검사
이 약 투여군과 위약 투여군 비교시 실험실적 검사수치에서 뚜렷한 차이는 관찰되지 않았다. 1% 이상 빈번하게 일어난 실험실적 검사 결과로는 요산 결과가 위약군에서 13%, 시험군에서 2.7% 증가되는 것이 관찰되었다.
리나글립틴 실험관 및 신장 안전성 연구(CARMElina)
이 CARMElina 연구는 대혈관질환 또는 신장질환에 대한 기저질환에 근거하여 실험관제 위험이 있는 제 2형 당뇨병 환자에서 위약 대비 리나글립틴의 실험관제 및 신장 안전성을 조사하였다(12. 전향적 평가를 위한 정보참조 참조). 이 연구는 리나글립틴(5mg)을 투여 받은 3494명의 환자와 위약을 투여 받은 3485명의 환자를 포함한다. 이 약 투여 시 주요한 실험관제 질환, 심부전으로 인한 입원 및 신장 결과 사례의 위험을 높이지 않았다. 리나글립틴을 투여 받은 환자에서서의 총 이상반응 및 중대한 이상반응 발생은 위약을 투여받은 환자에서서의 이상반응 발생과 유사하였다.

치료군에서 중증의 저혈당 사례는 이 약 투여군의 3.0%, 위약 투여군의 3.1%에서 보고되었다. 기저 상태에서 설폰닐우레아를 투여한 환자에서서의 중증의 저혈당 발생률은 이 약 투여군의 2.0%, 위약 투여군의 1.7%에 해당하였다. 기저 상태에 인슐린을 투여한 환자에서의 중증의 저혈당 발생률은 이 약 투여군의 4.4%, 위약 투여군의 4.9%에 해당하였다.

전체 연구 관찰 기간 동안, 급성 해당증 진단은 이 약 투여군의 0.3%, 위약 투여군의 0.1%에서 보고되었다.
유사천포창증은 이 약 투여군의 0.2%에서 보고되었으며, 위약군에서는 보고되지 않았다.

5) 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989~2014년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
· 소화기: 소화불량
· 전신 및 투여부위 이상: 부종, 얼굴부종, 말초부종
6) 국내 시간 후 이상사례 보고자료(1989~2015년)를 토대로 실리리분석 분석·평가 결과 사례 확인된 이상사례는 다음과 같다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
· 대사 및 영양계: 체중감소
· 정신계: 식욕증가

7) 국내 시간 후 조사결과
국내에서 재사용하여 6년 동안 3,119명을 대상으로 실시한 시간 후 조사 결과, 이상사례의 발현율은 인과관계와 상관없이 1.69%(240/3,119명, 총 313건)로 보고되었다. 이 중 인과관계와 상관없는 중대한 이상사례 및 인과관계를 배제할 수 없는 중대한 약물이상반응은 발현 빈도에 따라 아래 표에 나열하였다.

발현 빈도	인과관계와 상관없는 중대한 이상사례 1.57%(49/3,119명, 63건)	인과관계를 배제할 수 없는 중대한 약물이상반응 0.10%(3/3,119명, 6건)
기관계 명		

	위장관계 장애	변비, 상복부통, 소장대장염, 장폐색	상복부통
감염 및 침습	위장염, 대장포진, 방광염, 급성신우신염, 기관지염, 전장신경세포염, 파혈증	폐렴	
대사 및 영양 장애	식욕감소, 탈수	고혈당증, 식욕감소	
신경계 장애	뇌경색, 말다듬증, 알츠하이머형 치매		
전신장애 및 투여부위 상태	가슴통증, 발열, 얼굴부위 부종, 피로, 사망	피로	
호흡기, 흉부 및 종격 장애	만성폐쇄성폐질환, 천식		
피부 및 피하조직 장애	당뇨병성족부병증, 피부병변	피부병변	
신생물 양성, 악성 및 상세포형(낭종 및 용종 포함)	간전이, 급성백혈병, 기저세포암종, 비소세포암, 악성신장암, 위암, 직장암, 해당암		
순산, 중독 및 시술상 합병증	반월판손상, 진폐증		
심장 장애	울혈성 심부전, 협심증, 급성심근경색증, 불안정 협심증, 심장정지		
시각 장애	당뇨병성망막병증		
신장 및 비뇨기 장애	급성신장손상, 말기신장질환		
간담도 장애	급성담관염, 급성담낭염, 담관염		
귀 및 미로 장애	현기증		
면역계 장애	신장이식실패		
감염 및 침습	폐렴		
대사 및 영양 장애	고혈당증		
호흡기, 흉부 및 종격 장애	호흡기관		

또한, 인과관계와 상관없는 예상하지 못한 이상사례와 인과관계를 배제할 수 없는 예상하지 못한 약물이상반응은 발현 빈도에 따라 다음의 표에 나열하였다.

발현 빈도	기관계 명	인과관계와 상관없는 예상하지 못한 이상사례 6.64%(207/3,119명, 270 건)	인과관계를 배제할 수 없는 예상하지 못한 약물이상반응 1.19%(37/3,119명, 48건)
위장관계 장애	복통, 위장장애, 과민성대장증후군, 구강직장감염증, 대장염, 복부부종, 소장대장염, 연하곤란, 위궤양, 잇몸출혈, 폐 폐쇄, 치아손실, 치질, 허혈성 궤양	인과관계와 상관없는 예상하지 못한 이상사례 1.9%(37/3,119명, 48건)	설사, 구토, 위염, 위장장애, 과민성대장증후군
감염 및 침습	급성신우신염, 기관지염, 발발성증, 비염, 연조직염, 인두염, 전장신경세포염, 프프기부시, 치주염, 폐혈증, 편도염, 후두염	바이러스성*기도감염, 폐렴, 편도염	
대사 및 영양 장애	식욕감소, 고콜레스테롤혈증, 당뇨의 불충분한 조절, 영양실조, 저나트륨혈증, 탈수	고혈당증, 식욕감소, 당뇨의 불충분한 조절	
신경계 장애	뇌경색, 당뇨병성신경병증, 두통, 말다듬증, 감각 이상, 대장포진 후 신장염, 반부전비마, 실신, 알츠하이머형 치매, 편월	당뇨병성신경병증, 말다듬증, 출혈	
전신장애 및 투여부위 상태	피로, 가슴불편함, 무력증, 사망, 통증	피로	
호흡기, 흉부 및 종격 이상	코피, 구강인두 통증, 만성폐쇄성폐질환, 발작성에, 알레르기성비염, 운동성호흡곤란, 잦은 기침, 천식, 콧물, 폐종괴		
근골격계 및 결합 조직 장애	관절통, 골다공증, 관절염증, 근골격불완전, 근육염, 근육통, 연조직종괴, 폐경후 골다공증, 최최근 가증후군	관절통	
조사	혈중중성지방증가, 소변 알부민/크레아티닌 비율 증가, 소변백혈구양성, 혈색소감소, 혈중혈색소감, 혈중크레아티닌증가, 혈중크레아티닌산혈색소 증가	ALT 증가, 혈중중성지방증가	
피부 및 피하조직 장애	남성형탈모, 당뇨병성족부병증, 궤과다증, 말로, 피부부연, 피부암	피부병변	
신생물 양성, 악성 및 상세포형(낭종 및 용종 포함)	간전이, 급성백혈병, 기저세포암종, 비소세포암, 악성신장암, 위암, 직장암, 해당암		
정신 장애	불안, 정동장애	불면증, 우울증, 불안	
순산, 중독 및 시술상합병증	타박상, 골다박상, 뇌진탕, 반월판손상, 발골절손골절, 진폐증, 췌장선치		
심장 장애	울혈성 심부전, 협심증, 급성심근경색증, 두근거림, 불안정협심증, 심장정지		
시각 장애	당뇨병성망막병증, 건성안, 녹내장, 백내장, 구안 불편감, 알레르기성각막염	건성안, 백내장	
신장 및 비뇨기 장애	급성신장손상, 당뇨, 단백뇨, 말기신장질환, 복합성 요실금, 혈뇨	다뇨	
혈관 장애	저혈압, 홍조		
간담도 장애	간지장증, 급성담관염, 급성담낭염, 담관염, 담석증		
귀 및 미로 장애	난청	현기증	
생식계 및 유방 장애	발기기능장애		
내분비 장애	갑상선종		
면역계 장애	신장이식실패		
혈액 및 림프계 장애	빈혈		

드물게 (0.1% 미만)	대사 및 영양 장애	고혈당증	
전신장애 및 투여부위 상태	저혈당증, 감각저하	저지각음	
신경계 장애	가슴통증, 발열		
호흡기, 흉부 및 종격 장애	호흡기관		
위장관계 장애	오심, 설사, 상복부통, 구토, 위식도역류질환, 위염	오심, 상복부통	
감염 및 침습	바이러스성성기도감염, 성기도감염, 위장염, 폐렴, 대장포진, 방광염		
대사 및 영양 장애	고혈당증		
신경계 장애	저지각음, 감각저하	저지각음	
호흡기, 흉부 및 종격 장애	호흡기관		

근골격계 및 결합 조직 장애	골관절염, 사지통증		
조사	ALT 증가, AST 증가		
피부 및 피하조직 장애	가려움증	가려움증	
정신 장애	불면증, 우울증		
혈관장애	고혈압		
귀 및 미로 장애	현기증		
생식계 및 유방 장애	양성전립선비대증		

4. 일반적 주의
1) 중증 및 장மை 동반하는 관절통
DPP-4 저해제를 복용한 환자의 시판후 조사에서 중증 및 장மை 동반하는 관절통이 보고되었다. 약물 투여 이후 증상의 발생시기는 1일 후부터 수년 후까지 다양하였다. 약물 투여 중지 시에 증상은 완화되었다. 일부 환자에서는 동일한 약 또는 다른 DPP-4 저해제를 다시 복용시에 증상의 재발이 나타났다. 중증 관절통의 원인으로 DPP-4 저해제를 고려하여 적절한 경우 투여를 중지한다.

2) 수포성 유사천포창
DPP-4 저해제를 복용한 환자에서 입원을 필요로 하는 수포성 유사천포창이 보고되었다. 환자들은 일반적으로 DPP-4 저해제 투여중지 및 국소 또는 전신 면역억제제 치료로 회복되었다. 환자들에게 이 약을 복용하는 동안 수포 또는 지무름이 발생하면 즉시 의사에게 보고하도록 알려야 한다. 만약, 수포성 유사천포창이 의심되는 경우, 이 약을 중단하고 진단 및 적절한 치료를 위해 피부과 전문의와 상담해야 한다.

5. 상호작용
1) 약물상호작용에 대한 생체외(in-vitro) 평가
이 약은 CYP3A4에 대하여 약하거나 중등도 정도의 저해제이나 다른 CYP 동위효소에 대해서는 저해하거나 유도하지 않는다. 이 약은 P-당단백(glycoprotein)의 기질이고 P-당단백에 의한 미국산의 수송을 약하게 저해한다. 그러한 결과들과 생체내(in-vivo) 약물상호작용 연구에 따르면 이 약은 다른 P-gp기질들과 상호작용을 일으키지 않을 것으로 고려된다.
2) 약물상호작용에 대한 생체내(in-vivo) 평가
다음에 기술한 임상자료에 따르면 다른 의약품과 투여하였을 때 용량조절을 필요로 하는 임상적으로 유의한 상호작용이 관찰되지 않았다. 이 약은 메트포르민, 글리베클라마이드, 심바스타틴, 피오글리타존, 오파린, 디곡신 또는 경구 피임제에 대한 약동학에 대하여 임상적으로 유의한 영향을 나타나지 않았으므로 CYP3A4, CYP2C9, CYP2C8, P-당단백 및 유기양성수송체(OCT; organic cationic transporter)의 기질들과 약물상호작용을 일으키는 경향이 있을 것으로 고려된다

3) 메트포르민: 건강한 피험자들을 대상으로 메트포르민 850 mg을 1일 3회씩 다회 투여하고 리나글립틴 10 mg (교차용량)을 1일 1회 병용투여 하였을 때 리나글립틴 또는 메트포르민의 약동학 대하여 임상적으로 의미있는 변화를 나타내지 않았다.
4) 설폰닐우레아 : 글리베클라마이드(글리부리드) 1.75 mg을 단회 투여하고 리나글립틴 5 mg을 다회 투여하여 하였을 때 리나글립틴 5 mg의 약동학적으로 변화가 나타나지 않았다. 그러나, AUC 및 C_{max}에 14%의 감소가 있었다. 글리베클라마이드와 같이 CYP2C9에 의해 소실되는 다른 설폰닐우레아 제제들(예: 글리피지드, 톨부타미드 및 글리메피리드)과 임상적으로 의미 있는 상호작용이 기대되지 않는다.
5) 티아졸리디논 : CYP2C8 및 CYP3A4의 기질인 피오글리타존을 1일 용량인 45 mg으로 다회 투여하고 리나글립틴 10 mg (교차용량)을 다회 병용투여 하였을 때 리나글립틴 또는 피오글리타존 또는 피오글리타존의 유효대사체의 약동학에 임상적으로 관련 있는 영향이 나타나지 않았다.
6) 리피디드 : P-당단백 및 CYP3A4의 강력한 억제제인 리토나비어가 리나글립틴의 약동에 미치는 영향을 평가하기 위한 연구가 수행되었다. 리나글립틴 5 mg을 단회 경구투여하고 리토나비어 200 mg을 다회 병용투여 하였을 때 리나글립틴의 AUC 및 C_{max}가 각각 2배 및 3배 증가하였다. 이러한 리나글립틴의 약동학적 특변화는 임상적으로 관련이 없는 것으로 고려된다. 그러므로 다른 P-당단백/CYP3A4 억제제들과 임상적으로 관련이 있는 상호작용은 나타나지 않을 것이며 투여용량 조절이 요구되지 않는다.
7) 리피디드 : P-당단백 및 CYP3A4의 강력한 유도제인 리팜피신이 리나글립틴 5 mg의 약동에 미치는 영향을 평가하기 위한 연구가 수행되었다. 리나글립틴 및 리팜피신을 다회 병용투여한 결과, 리나글립틴의 AUC 및 C_{max}가 각각 39.6% 및 43.8% 감소하였고 저점에서는 DPP-4 저해가 약 30% 감소하였다. 그러므로, 리나글립틴을 강력한 P-gp 유도제와 병용투여 하였을 경우 임상적으로 유용성은 있는 것으로 기대이나 충분한 유효성을 나타내지는 않을 것이다.
8) 다극산 : 건강한 자원자들에게 리나글립틴 1일 용량인 5 mg과 디곡신 0.25 mg을 각각 다회 투여하였을 때 디곡신의 약동학적 영향은 없었다.
9) 와라핀 : 리나글립틴 1일 용량인 5 mg을 다회 투여하였을 때 CYP2C9 기질인 S(-) 또는 R(+) 와라핀의 약동학적으로 변화를 가져오지 않았다.
10) 심바스타틴: 건강한 자원자들을 대상으로 리나글립틴 10 mg 및 심바스타틴 40 mg을 함께 62일 간 투여하였을 때 심바스타틴의 혈장 AUC는 34%, 혈장 C_{max}는 10% 증가하였다. 리나글립틴은 CYP3A4-매개 대사를 약하게 억제하므로 CYP3A4에 의해 대사되는 기질을 동시에 투여하였을 때 이들의 용량조절은 필요하지 않은 것으로 고려된다.

11) 경구피임제 : 리나글립틴 5 mg을 레보노게스트렐 또는 에티닐에스트라디올과 병용투여 하였을 때 이들의 약동학적인 정류상태에 변화를 가져오지 않았다.

6. 임부, 수유부에 대한 투여

1) 임부 : 임부를 대상으로 한 대시한 결과는 없으므로 임부에서의 사용은 권장되지 않는다. 동물실험에서 최고 투여용량인 240 mg/kg/day (AUC 비교에 의하면 인체 노출도의 약 943배)를 투여하였을 때 생식력에 이상반응은 관찰되지 않았다.

수태한 랫드와 토끼에 경구 투여했을 때 리나글립틴은 태반을 거쳐 태자로 전달되었다.

2) 수유부 : 동물실험에서 리나글립틴 및 대사체가 모유를 통해 배출되는 것이 관찰되었다. 이 경우 사람 유즙으로 분비되지는 알려지지 않았다. 이 약을 수유 부에게 투여할 때 주의해야한다.

7. 소아에 대한 투여
소아에서의 안전성 및 유효성은 확립되지 않았다.

8. 고령자에 대한 투여
이 약의 임상시험에 참여한 환자(중 4040명) 중 65세 이상 환자는 1085명, 75세 이상 환자가 131명이었다. 고령자에서의 안전성 유효성은 젊은 환자와 차이가 없었다. 고령자에서의 용량용량 조절이 필요하지 않다.

9. 신장애 및 신장애 환자에 대한 투여
신기능 이상 환자 및 신기능 이상 환자에서 투여시 용량용량 조절이 필요하지이다.

10. 과량투여시의 처치
1) 건강한 피험자를 대상으로 실시한 대조군 시험에서 리나글립틴을 최대 600 mg (관장용량의 120배)를 투여하여도 내약성이 우수하였다. 인체에 대하여 600 mg이상 투여한 경험은 없다.
2) 과량이 투여되었을 경우 일반적인 지지요법을 실시하는 것이 합리적이다. 예를 들면, 위장관에서 흡수되지 않은 물질들을 제거하고 임상 증상을 관찰해야 하며 즉시 임상 조치를 취한다.

11. 보관 및 취급상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고의 원인이 되거나 품질유지 면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의할 것.

12. 전문가를 위한 정보

1) 임상시험 정보
단독요법
이 약 단독요법의 유효성 및 안전성은 24주 지속기간의 이중 눈가림 위약-대조 시험에서 평가되었다. 이 약 1일 1회 요법은 위약 대비 유의한 당화혈색소(HbA1c)의 개선을 나타냈다(위약대비 -0.69% 변화). 이 약의 위약 대비 평균 혈당(fasting plasma glucose, FPG) 감소 (-23.3mg/dL) 및 식후 2시간 혈당(2h-post prandial glucose, 2h-PPG)의 감소를 보였으며, HbA1c 7% 미만을 달성한 환자의 비율이 위약 대비 더 높았다. 이 약에 의한 HbA1c의 개선은 성별, 연령, 체질량지수(BMI, 대사 증후군 또는 인슐린 저항성 지수(HOMA-IR)에 의해 영향을 받지 않았다.
이 약 단독요법의 유효성과 안전성은 메트포르민 불내성 또는 투여금지 환자를 대상으로 한 18주 지속기간 후 34주 지속기간 동안 24시간(위약군은 글리메피리드군으로 전환함), 이중 눈가림, 위약-대조 시험에서도 평가되었다. 18주차에 이 약은 위약 대비 HbA1c의 유의한 개선을 나타냈으며 (위약 대비 -0.60% 변화) 베이스라인 대비 평균 HbA1c의 변화는 18주차부터 52주차까지 일정하게 유지되었다. 18주차 이 약은 위약 대비 FPG의 유의한 감소를 보였으며(위약 대비 -20.5mg/dL), HbA1c 7% 미만을 달성한 환자의 비율이 위약 대비 높았다. 이 약 단독요법을 보글리보스(1일 0.6mg)와 비교한 일련의 대상 26주 이중 눈가림 시험에서 이 약 5mg은 보글리보스 대비 HbA1c의 유의한 개선을 나타냈으며(보글리보스 대비 -0.32% 변화) FPG의 유의미한 감소를 보였대(보글리보스 대비 -6.9 mg/dL)였다.

병용요법
메트포르민 단독요법에 대한 이 약의 추가 병용
메트포르민 단독요법으로 충분한 혈당 조절이 되지 않는 환자에 대한 이 약의 추가 병용의 유효성과 안전성은 24주 지속기간의 이중 눈가림 위약-대조 시험에서 평가되었다. 24주차 이 약은 위약 대비 유의한 HbA1c의 개선을 나타냈다(위약 대비 -0.64% 변화). 또한 이 약은 위약 대비 FPG 감소(-21 mg/dL) 및 2h-PPG 감소(17.1 mg/dL)를 나타냈으며, 이 약의 HbA1c 7%미만 달성 환자 비율은 위약 대비 더 높았다.

메트포르민 단독요법으로 충분한 혈당 조절이 되지 않는 환자를 대상으로 이 약의 추가 병용의 유효성과 안전성을 글리메피리드와 비교한 104주 임상에서 이 약의 HbA1c 감소 효과는 글리메피리드 대비 +0.20%로 비열등하였다. 메트포르민과 초기 병용

이전 당뇨병 약물치료를 받은 경험이 없거나 단독요법으로 충분한 혈당 조절이 어려운 환자들 대상으로 리나글립틴과 메트포르민의 초기 병용의 유효성은 24 주 위약-대조, 이중눈가림, 요인(factorial) 연구에서 평가되었다. 리나글립틴 2.5mg과 메트포르민 500mg 또는 리나글립틴 2.5mg과 메트포르민 1000mg 1일 2회 요법은 두 약물의 단독요법에 비해 혈당 관련 파라미터의 유의한 개선을 보였다. 리나글립틴 2.5mg과 메트포르민 1000mg 1일 2회 요법의 메트포르민 평균 HbA1c 감소는 각각 0.51%(95% CI -0.73, -0.30; p<0.0001) 및 -1.14(95% CI -1.36, -0.92; p<0.0001)였으며, 리나글립틴 2.5mg과 메트포르민 500mg 1일 2회 요법의 메트포르민 500mg 1일 2회 요법 또는 리나글립틴 5mg 1일 1회 요법 대비 보정된 평균 HbA1c 감소는 0.58%(95% CI -0.79, -0.36; p<0.0001), 및 0.77%(95% CI -0.99, -0.55; p<0.0000)이었다.

HbA1c 7.0% 미만 달성률은 리나글립틴과 메트포르민 초기 병용군에서 각각의 단독요법 대비 더 높았다. 대체로 베이스라인 대비 HbA1c 감소는 베이스라인 HbA1c가 더 높은 환자에서 더 크게 나타났다.
설폰닐우레아 단독요법에 대한 이 약의 추가 병용
설폰닐우레아 단독요법으로 충분한 혈당 조절이 되지 않는 환자에 대한 이 약의 추가 병용의 유효성과 안전성은 18주 지속기간의 이중 눈가림 위약-대조 시험에서 평가되었다. 18주차 이 약은 위약 대비 HbA1c의 유의한 개선을 나타냈으며(위약 대비 HbA1c -0.47% 변화), HbA1c 7.0% 미만을 달성한 환자의 비율은 위약 대비 더 높았다.

인슐린(+/- 메트포르민) 요법에 대한 이 약의 추가 병용
다양한 인슐린 배경요법(인슐린 단독, 인슐린과 메트포르민, 인슐린과 피오글리타존, 인슐린과 메트포르민 및 피오글리타존)에 대한 이 약의 추가 병용의 유효성과 안전성은 24주 지속기간의 이중 눈가림 위약-대조 시험에서 평가되었다. 24주 시험에 인슐린 요법에 대한 이 약의 추가병용은 위약 대비 유의한 HbA1c 개선을 보였대(위약 대비 -0.65% 변화). 경구용 혈당강화제 배경요법

에 따른 하위군 분석에서도 인슐린 단독군(약 16%) 및 인슐린과 메트포르민군(약 76%)은 각각 위약 대비 유의한 HbA1c 감소를 나타냈다.

메트포르민과 설폰닐우레아 병용요법에 대한 이 약의 추가 병용
메트포르민과 설폰닐우레아 병용요법으로 충분한 혈당 조절이 되지 않는 환자에 대한 이 약 추가 병용의 유효성과 안전성은 24주 지속기간의 위약-대조 시험에서 평가되었다. 24주차 이 약은 위약 대비 유의한 HbA1c의 개선을 보였대(위약 대비 -0.62% 변화). 또한, 이 약의 HbA1c 7.0% 미만을 달성한 환자의 비율이 위약 대비 더 높았으며, 위약 대비 FPG 감소는 -12.7mg/dL였다.

메트포르민과 엠파글리클로진 병용요법에 대한 리나글립틴의 추가 병용
메트포르민과 엠파글리클로진(10mg 또는 25mg)의 병용요법으로 충분한 혈당 조절이 되지 않는 환자를 대상으로 리나글립틴 5mg을 추가 병용한 24주 이중 눈가림, 위약 대비 시험에서 위약 대비 베이스라인으로 보정된 평균 HbA1c 감소는 각각 -0.32%(메트포르민과 엠파글리클로진 10mg 배경요법) 및 -0.47%(메트포르민과 엠파글리클로진 25mg 배경요법)으로 유의한 차이를 보였다. 베이스라인 HbA1c가 7% 이상인 환자를 대상으로 한 사전에 정의된 하위군 분석(메트포르민과 엠파글리클로진 10 mg 또는 메트포르민과 엠파글리클로진 25mg 배경요법에 대한 각각의 환자 수 n=66 및 n=42)에서 리나글립틴의 추가 병용에 대한 24주차 베이스라인으로 보정된 평균 HbA1c의 감소는 위약 대비 각각 -0.33%(p=0.0875) 및 -0.62%(p=0.0046)이었다.

특수 집단에 대한 임상정보

고령자
70세 이상인 제2형 당뇨병환자를 대상으로 한 다양한 배경요법(메트포르민 및/또는 설폰닐우레아 및/또는 인슐린)에 대한 이 약 추가병용의 유효성 및 안전성은 24주 지속기간의 이중눈가림, 위약-대조 시험에서 평가되었다. 배경약물의 용량은 첫 12주 동안 임상적으로 유지되었으며, 이후 용량조절이 허용되었다.