

조인본 콘드로 800 정

JCB-INS-01

일반의약품

● 원료약품 및 분량 1정 중

■ 유효성분

콘드로이틴설페이트나트륨(KP)	800mg
벤포타아민(비타민B ₁)(KP)(티아민염산염으로서 36.15mg)	50mg
나코틴산아미드(비타민B ₃)(KP)	30mg
피리독살포스페이트수화물(비타민B ₆)(KP)	30mg
리보플라빈부타이레이트(비타민B ₂)(KP)(리보플라빈으로서 5.7mg)	10mg
농축콜레칼시페롤산(EP)(비타민D ₃ 로서 1000IU)	10mg
메코발라민(비타민B ₁₂)(KP)	1mg
아노시톨(KP)	25mg
클린타르타르산염(별규)	25mg
시트르산칼슘(USP)(칼슘으로서 12.64mg)	60mg
산화아연(Zn)(KP)(아연으로서 4mg)	5mg
산화마그네슘(Mg)(KP)(마그네슘으로서 18.1mg)	30mg
감마-오리자놀(KP)	5mg

■ 동물유래성분: 콘드로이틴설페이트나트륨(기원동물: 소, 부위:연골)

■ 첨가제: 미결정셀룰로스, 전분글리콜산나트륨, 경결무수산, 스테아르산마그네슘, 탭실디칼세(998703)

● 성상 적갈색의 강방형 필름코팅정

앞면	뒷면	측면
		

● 효능·효과

○ 다음 경우의 비타민 B₁, B₂, B₆, D의 보급

- 육체피로·임신·수유기·병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시·발육기·노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 효과는 다음과 같다.

- 비타민B₁(벤포타아민): • 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절염(오래된, 어깨결림 등) • 각기 • 눈의 피로
- 비타민D(농축콜레칼시페롤산): • 뼈, 이의 발육불량 • 구루병의 예방

● 용법·용량 만 19세 이상 및 성인: 1일 1회 1정 복용

※ 충분한 양의 물과 함께 복용합니다.

● 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis: 원인을 알 수 없는 전신 염증질환, 신장질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 3) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 4) 신장결석 환자
- 5) 심한 증상의 신부전 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구(먹는, 복용하는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 비타민D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.
- 3) 심장 순환기계기능 장애 환자
- 4) 신장(콩팥)장애 환자
- 5) 저단백혈증 환자
- 6) 강신배당체를 투여 중인 환자
- 7) 신장결석 병력이 있는 환자
- 8) 임부

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과사, 약사와 상의하십시오. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
- 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 식욕부진, 복부(배부위)팽만감, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 붉은반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 위장관장애, 소화장애, 상복부부종, 폐부종, 흉부, 두드러기, 습진, 발진, 반구진성 발진, 가려움, 부종, 부종 수분저류(신부전 또는 심부전 환자)
- 2) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 3) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
- 4) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperursemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
- 5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성신부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 6) 장기간투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있습니다.
- 7) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용(사용))투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 8) 유발적으로 과량복용 한 경우
- 9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법 용량을 잘 지키십시오.
 - 2) 용을 황색으로 변하게 하여 임상검사에서 영향을 줄 수 있습니다.
 - 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.
- ### 6. 저장상의 주의사항
- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
 - 3) 오염(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

● 사용기한 외포장에 표기

● 포장단위 30정/병, 60정/상자(30정/병X2)

● 저장방법 밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관

※ 정제를 깨낸 후에는 뚜껑을 꼭 닫아주시고(모든 제품은 습기가 많은 곳에서는 보관 중 인산(흡수)되어 변색될 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.)

※ 이 제품은 정부의 “소비자분쟁해결기준”에 의거 구입처를 통하여 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.

※ 이 첨부문서의 작성연월일 이후 변경내용은 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

※ 이 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

첨부문서 작성연월일: 2024. 03. 29

판매자



유한양행

본사: 서울특별시 동작구 노량진로 74
공장: 충북 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 219

홈페이지: www.yuhan.co.kr 소비자상담실: 080-024-1188(수신자 요금부담)

제조사



성이바이오테크놀로지(주) 강원특별자치도 원주시 지정면 지례로 184