

디자인 사양		
제품명	[녹십자]아이간유연질캡슐 _ 설명서	
규격	120 X 200 mm	
인쇄	1도(먹) ■ K	
재질 및 후가공	모조 70	
특이사항	신규	

촉촉하게 채우는 눈 영양제

아이간유

연질캡슐

본 약을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 본 첨부문서를 본 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

【원료약품 및 그 분량】1캡슐(900mg) 중

- 유효성분 : 리보플라빈(KP) 3.00mg
티아민질산염(KP) 6.30mg
콘드로이틴설페이트나트륨(KP) 25.00mg
간유(비타민A)로서 500 IU(EF) 500.00mg
- 첨가제(동물유래성분) : 젤라틴(돼지, 가축)
- 기타첨가제 : 공기를, 황납, 아자경화유, 레시틴, 농글리세린, 소르비톨액(비결장성), 치자청색소, 산화티탄

【효상】 주황색의 내용물을 함유한 파란색의 타원형 연질캡슐

- 【효능·효과】
- 다음 경우의 비타민 A, B1, B2의 보급
 - 육체피로
 - 임신·수유기
 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
 - 노년기
 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 눈의 건조감의 완화
 - 야맹증(밤에 잘 못보는 증상)
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등)
 - 각기
 - 눈의 피로
 - 다음 증상의 완화 : 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

【용법·용량】 만 8세 이상 및 성인 : 1일 2회, 1회 2캡슐 복용

【사용상의 주의사항】

- 경고
 - 임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 말 것.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 만 3개월 미만의 젖먹이
 - 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.
 - 만 1세 미만의 젖먹이
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생) 증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A 결핍증치로에 사용하는 경우를 제외 하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다.
 - 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 황장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성유제를 신중히 투여해야 하는 환자

 눈의 건조감 완화

 야맹증

 눈의 피로

일반의약품

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종(부기), 붉은 변, 변비, 설사, 식욕부진, 홍반(붉은 반점), 두드러기, 습진, 발진, 반구진성 발진, 가려움, 부종(부기), 부종(부기)·수분저류(신부전 또는 심부전 환자)
- 장기간 고용량의 비타민 A(베타카로틴)으로부터 전환된 것을 제외한 섭취는 폐장기를 지난 여성의 골다공증(뼈약성증) 위험을 높일 수 있다.
- 우발적으로 과량복용 한 경우
- 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것.
- 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 한다.
- 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있다.
- 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다.
환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여 받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 직사광선을 피하고 뭄 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
- 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【포장단위】 240캡슐/상자(120캡슐(10캡슐/PTP*12)*2)
【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관
【사용기간】 제조일로부터 24개월
【소비자상담실】 080-260-0033

※ 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.
※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)
※ 유효기간 또는 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 주의해 주십시오.
※ 구입시 유효기간 또는 사용기한이 지났거나 변질, 변색, 오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.

설명서 작성일자 : 2024.10.14
※ 위 일자는 설명서 작성일자로 사용기한과 관련이 없습니다.

제조원  알피바이오
㈜알피바이오 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7

판매원  GC녹십자
㈜녹십자 충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 586