

70모조
90*165mm

4단접지

BLACK

관절건강을 위한
고함량 콘드로이틴!

일반의약품

메코조인 콘드로 800

【유효성분】

콘드로이틴설페이트나트륨(KP).....	800 mg
벤조티아민(티아민염산염으로 36.15mg)(KP).....	50 mg
니코틴아미드(KP).....	50 mg
피리독신염산염(KP).....	50 mg
판토텐산칼슘(KP).....	15 mg
리보플라빈(KP).....	6 mg
메코발라민(KP).....	1000 µg
농축콜레칼시페롤 산(비타민D ₃ 로서 1000IU)(EP).....	10 mg
이노시톨(KP).....	25 mg
콜린타르타르산염(별규).....	25 mg

【첨가제】

미결정셀룰로오스, 크로스포비돈, 전분글리콜산나트륨, 경질무수규산, 스테아르산마그네슘, 톱실드갈색(99B703)

【동물유래성분】 콘드로이틴설페이트나트륨(기원:소, 사용부위:연골)

【성상】 적갈색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】

○ 다음 경우의 비타민 D, B₁, B₂, B₆의 보급
- 육체피로 - 임신·수유기 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시 - 발육기 - 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
· 뼈, 이의 발육불량 · 구루병의 예방 · 각기 · 눈의 피로
· 다음 증상의 완화:
신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

【용법·용량】 만 19세 이상 성인 : 1회 1정, 1일 1회 복용한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 3) 만 12개월 미만의 첫먹이 4) 신장결석 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 - 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다. 3) 심장·순환기계기능 장애 환자 4) 신장장애 환자 5) 저단백혈증 환자 6) 신장결석 병력이 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 - 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 변비, 식욕부진, 흉만, 두드러기, 습진, 발진, 반구진성 발진, 가려움, 부종, 부종·수분저류(신부전 또는 심부전 환자) 2) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. 3) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다. 4) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다. 5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장 증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. 6) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것. 7) 우발적으로 과량복용 한 경우 8) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상 검사치에 영향을 줄 수 있다. 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 30정/병, 60정/상자(30정/병X2))

【제조사】

성인바이오제약 주식회사
강원특별자치도 원주시 지정면 지래울로 184 1층 일부, 3층

【제조의뢰자】

(주)경보제약 본사·공장 : 충청남도 아산시 실옥로 174
서울사무소 : 서울특별시 서대문구 충정로 8

【소비자상담실】 02-365-2312

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약, 구입 시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변색, 오염, 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 약을 사용하기 전에 반드시 첨부문서를 주의 깊게 읽어보시고 첨부문서는 항상 약과 함께 보관하십시오.

※ 부작용 발생 시 피해 구제 상담 : 14-33330

※ 부작용 신고 및 피해 구제 상담 : 1644-6223

※ 경보제약 홈페이지 : www.kbpharma.co.kr

제조의뢰자: KyongboPharm  **동원약품** 가족회사

본사·공장 : 충청남도 아산시 실옥로 174

서울사무소 : 서울특별시 서대문구 충정로 8

소비자상담실 : 02)365-2312

작성일 : 2024년 04월 26일

101:240426